

米,在云南上升到海拔 2000 米的林中。日本有分布。模式标本采自日本琉球。

这个种分布很广,其形态特征亦颇稳定。在它的分布区中心部分,叶的质地很一致,只在分布区的边缘才起变化,我国台湾产的标本叶片常为薄革质,云南产的标本也有类似的现象,在金屏以东的标本,叶的质地和两广的完全一致,金屏以西的标本叶片逐渐变薄,到了怒江及澜沧江流域,已经是披针叶杜英 *E. lanceaefolius* Roxb. 的分布区。Bentham 在《香港植物志》所记载的 *E. lanceaefolius* Roxb., 其实是本种,前者只分布于印度到我国云南西北部及东南部,不再往东扩展,而本种则从我国台湾一直分布到云南东南部,这里似乎是两者的分界线,又是接触带。所谓 *E. hayatae* Kanehira et Sasaki, 从原始描述看来和本种没有区别,李惠林在《台湾树木志》里(534 页)亦认为它和本种是同属一个种。

38. 披针叶杜英 (新拟)

***Elaeocarpus lanceaefolius* Roxb. Hort. Beng. 42. 1814. nom. nud., et Fl. Ind. 2: 598. 1832; Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 402. 1874.**

乔木,高 20 米,树皮灰黑色,顶芽有灰色柔毛;嫩枝有微毛,很快变秃净,干后黑褐色。叶薄革质,披针形或倒披针形,长 9—14 厘米,宽 3—4 厘米,先端渐尖或尾状渐尖,尾部长 1.5—2 毫米,基部楔形,多少下延,上面干后暗褐色,不发亮,下面淡褐色,无毛,侧脉 10—11 对,在上面明显,在下面突起,网脉在上下两面均能见,边缘有明显钝齿;叶柄长 1.5—2.5 厘米,多少有微毛,上部肿大,干后黑色。总状花序长 7—10 厘米,生于无叶的去年老枝上,花序轴有毛;花柄长 6—7 毫米;萼片 5 片,披针形;花瓣比萼片稍短,边缘有睫毛;雄蕊 15 枚,花药顶端无附属物;花盘有腺体 5 个,每个 2 裂,被毛;子房被毛,3 室,有时 2 室。核果卵圆形,长 3—3.5 厘米,宽 2.5 厘米,内果皮坚骨质,表面多沟纹,1 室,种子长 2 厘米。花期 6—7 月。

产于云南西北部。生长于海拔 2300—2600 米的山坡上。喜马拉雅东南麓也有分布。模式标本采自锡金。

本种和杜英 *E. decipiens* Hemsl. 的区别在于后者的叶革质,叶柄较短,萼片有毛,雄蕊较多,核果较小。

2. 猴欢喜属——*Sloanea* Linn.

Linn. Sp. Pl. 512. 1753. — *Echinocarpus* Bl. Bijdr. 56. 1826.

乔木。叶互生,具长柄,全缘或有锯齿,羽状脉,托叶不存在。花单生或数朵排成总状花序生于枝顶叶腋,有长花柄,通常两性;萼片 4—5 片,卵形,镊合状或覆瓦状排列,基部略连生;花瓣 4—5 片,有时或缺,倒卵形,覆瓦状排列,顶端全缘或齿状裂;雄蕊多数,插生在宽而厚的花盘上,花药顶孔开裂或从顶部向下开裂,药隔常突出成喙,花丝短;子房 3—