

国有分布。模式标本采自不丹。

3. 膜叶猴欢喜 (新拟)

Sloanea dasycarpa (Benth.) Hemsl. in Hook. Ic. Pl. **27**: t. 2628. 1900; M. J. E. Coode in Kew Bull. **38**(3):405, 1983. — *Echinocarpus dasycarpus* Benth. in Journ Linn. Soc. v. Suppl. **2**:73.1861. — *S. formosana* Li, Woody Fl. Taiwan 538. 1963.

常绿乔木;嫩枝无毛。叶膜质,两年生,长圆形或倒卵状长圆形,中部或中部以上最宽,长12—20厘米,宽4—7厘米,先端渐尖或急短尖,基部渐变狭窄,基底窄而钝或窄而圆,上下两面均秃净无毛,或初时有稀疏短柔毛,以后变秃净,仅在脉腋间有毛丛,侧脉4—5对,在上面能见,在下面稍突起,网脉在两面均能见,在下面较明显,全缘或有小锯齿;叶柄长2—3厘米,无毛,纤弱。花生于枝顶叶腋内,花柄长2—4厘米,有短柔毛;萼片4—5片,广卵形,长5毫米,被柔毛,先端圆;花瓣长短不一,长6—8毫米,上部撕裂,外侧有微毛;雄蕊比花瓣稍短;子房有粗毛,花柱长6—8毫米,无毛。蒴果圆球形,直径2—2.5厘米,3—4片裂开,果片厚约2毫米;针刺长2—3毫米,褐色;种子长8毫米,黑色,有光泽,假种皮薄。花期4—5月,果实9—10月成熟。

产于台湾及云南。生长于海拔1400—2000米的森林里。不丹及印度东部有分布。模式标本采自不丹。

本种是国产猴欢喜属中唯一具有间断分布的代表,在喜马拉雅和我国台湾之间有它的近缘种薄果猴欢喜 *S. leptocarpa* Diels 把这个间断空间连结起来。李惠林曾把我国台湾产的这类标本定为一个独立的种,我们根据中山大学收藏的台湾标本 (K. Odashima s. n., 原台北大学标本室号数13611, 中山大学标本号115514), 使之和云南的标本作比较, 找不出明显的区别, 因此主张把它合并到一起。M. J. E. Coode 则把 *S. formosana* Li 归并入 *S. chingiana* Hu 作为异名 (Kew Bull. **38**(3):407. 1983)。

4. 百色猴欢喜 (中国高等植物图鉴)

Sloanea chingiana Hu in Journ. Arn. Arb. **11**: 49. 1930; Hu et Chun Ic. Pl. Sin. **4**: 24. Pl. 174. 1935; M. J. E. Coode in Kew Bull. **38**(3):407. 1983.

百色猴欢喜 (原变种) 图版 7

var. *chingiana*

常绿乔木,高14米,胸径30厘米,树皮灰色,平滑;嫩枝较粗大,初时有短柔毛,以后变秃净或有残留微毛,老枝多皮孔。叶革质,长圆形,长12—20厘米,宽4—7.5厘米,先端渐尖,基部钝或有时略圆,上面绿色,干后略有光泽,下面除脉腋间有毛丛外均秃净无毛,侧脉6—8对,在上面明显,或稍下陷,在下面突起,网脉明显,全缘,干后边缘稍皱缩;叶柄长2.5—5厘米,较粗壮,无毛或略有短柔毛。蒴果圆球形,单生或数个簇生于当年枝的顶端;果柄长3—5厘米,有褐毛;果实直径1.5—2厘米,3—4片裂开,果片厚1.5毫米,