

毛;雄蕊与花瓣等长,花药长5毫米,先端有长1.5毫米的芒刺;子房被褐色茸毛,花柱突出雄蕊之上,长5—6毫米。蒴果大小不一,4—5片裂开,稀为3或6片,果片长2.5—5厘米,厚3—5毫米;内果皮紫红色或黄褐色;针刺长1—2厘米;果柄长2.5—6厘米,通常粗壮;种子黑褐色,发亮,长1.2—1.5厘米,下半部有黄褐色假种皮。花期7月。

产于湖南、湖北、四川、云南、贵州及广西。生长于海拔1110—1400米的常绿林里。越南有分布。

本种长叶猴欢喜 *S. assamica* Rehd. et Wils. 较接近,惟后者的叶长圆形或倒披针状长圆形,且长达30厘米,侧脉亦较多而区别。

Coode 把滇东文山、红河及屏边等地的标本 Tsai 51585. 62575. Henry 13654 (Rehd. et Wils. 曾定为 *S. assamica*) 定为 *S. hemsleyana* var. *yunnanica*, 我们采取保留态度。

### 13. 长叶猴欢喜

***Sloanea assamica*** (Benth.) Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**: 362. 1916. — *Echinocarpus assamicus* Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. **2**: 72. 1861; Masters in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 399. 1874. — *S. Sterculiaceae* (Benth) Rehd. et Wils. var. *assamica* (Benth.) Coode in Kew Bull. **38**(3): 387. 1983.

乔木,高10米,树皮暗褐色,稍粗糙,多细小皱褶裂纹;嫩枝有微毛,以后变秃净,有稀疏皮孔。叶聚生于枝顶,薄革质,长圆形或倒卵状长圆形,长15—28厘米,宽5—8厘米,先端急短尖,尖头钝,下半部渐变狭窄,基部窄而钝,有时窄而略圆,上面干后无光泽,下面无毛,仅在脉腋间有毛束,侧脉8—10对,在上面能见,在下面突起,网脉明显,全缘或靠近先端有不明显稀疏小钝齿;叶柄长2—4厘米,通常无毛。花数朵生于枝顶叶腋内;花柄长5—7厘米,被微毛;萼片及花瓣已脱落;花盘肿大;子房被褐色毛,3—4室,花柱长1厘米,有沟3—4条。蒴果3—4片裂开,果片长3.5—4.5厘米;针刺长1.5厘米;种子长约1.5厘米,假种皮黄色。花期7月。

产于云南西部的景东、保山一带,但未见于横断山脉。喜马拉雅南麓有分布。模式标本采自印度阿萨姆。

Coode 把这个种归并入苹婆猴欢喜 *S. sterculiaceae* 作为一个变种。但这个种的叶片基部狭窄。下面及叶柄均无毛,而苹婆猴欢喜的叶片基部近心形,被明显的茸毛。Coode 还把 Rehder et Wilson 所用的红河标本 Henry 13654. 归入 *S. hemsleyana* var. *yunnanica* Coode, 并且把文山及屏边标本,蔡希陶 H. T. Tsai 51585. 62575 也列入这个变种。我们对此采取保留态度。这里所采用的,归入 *S. assamica* Rehd. et Wils. 的标本,叶片全缘,具有和 *S. hemsleyana* Rehd. et Wils. 完全不同叶片和齿式。它们的产地是滇西的景东和保山等地。