

产于安徽、江苏、浙江及江西。模式标本采自安徽黄山附近。

这个种的叶基心形或截形,下面有多数短小的呈点状的星毛。在本属里,具有这种特殊毛被的除了本种外,还有黔椒 *T. kweichouensis* Hu 及全缘椒 *T. integerrima* H. T. Chang, 但前者的嫩枝及顶芽完全无毛,果实有棱;后者的嫩枝被黄褐色茸毛,叶全缘,侧脉较多,可资区别。

31. 长苞椒(中国高等植物图鉴补编第二册)

Tilia chenmoui Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. 10:170. 1936.

乔木,高 17 米,胸围 1.5 米,树皮浅灰色;嫩枝及顶芽密被灰色或灰黄色星状茸毛,老枝秃净。叶卵形,长 8—11 厘米,宽 5.5—7 厘米,先端短尖,基部斜圆形或截形,稀为微心形,上面秃净,下面被灰白色星状茸毛,侧脉 5—6 对,边缘有疏锯齿,齿刻相隔 4—8 毫米,齿尖长不到 1 毫米;叶柄长 3—4.5 厘米,被毛。聚伞花序长 12—16 厘米,有花 3—6 朵,花序柄有毛,下部 6—8 厘米与苞片合生;花柄长 1.5—1.8 厘米,有茸毛;苞片狭窄倒披针形,长 12—16 厘米,宽约 1.5 厘米,先端钝,基部狭窄而下延,上面有稀疏柔毛,下面毛被较密,基部有短柄,柄长 5—7 毫米。果实球形,宽 7—9 毫米,无棱,被毛,有小突起。

产于云南大理到嵩明一带。模式标本采自云南宾川鸡足山。

32. 南川椒(植物分类学报)

Tilia nanchuanensis H. T. Chang in Acta Phytotax. Sin. 20(2):174. 1982.

乔木,高 15 米,树皮暗褐色;嫩枝及顶芽均无毛。叶纸质,近圆形,长 5—8 厘米,宽 5—7 厘米,先端钝或短急尖,有时圆形,基部斜心形,上面干后黄绿色,无毛,稍发亮,下面被灰黄色紧贴茸毛,侧脉 5—6 对,边缘上半部有细锯齿或近全缘;叶柄长 2.3—3 厘米,纤细,秃净。果序长 6—9 厘米,有果实 2—5 个,果序柄纤细,秃净;果柄长 7—12 毫米;苞片长 7—10 厘米,狭匙形,宽 8—15 毫米,下面有星状茸毛,基部有柄长 5—8 毫米。核果倒卵形,无棱,被茸毛。

产四川。生长于海拔 1700 米的山地森林里。模式标本采自四川南川。

这个种和椴树 *T. tuan* Szyszylowicz 接近,但叶片近圆形,干后黄绿色,下面有灰黄色贴毛,苞片有长为 5—8 毫米的柄,花序亦较短小等而区别。

2. 黄麻族——Trib. Corchoreae Burret in Bot. Gart. Mus.

Berlin. 9:604. 1926. in Notizbl.

草本;花两性;有或无退化雄蕊;有或无雌雄蕊柄;花瓣无腺体;胚珠多数;蒴果。

本族有 2 属,我国均产。