

9. 六翅木族——Trib. *Berryeae* Burret

Burret in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin **9**: 599. 1926.

雄蕊全部发育。胚乳存在。蒴果每室有 2 翅,胚珠垂生于室顶端。

本族 2 属,我国有 1 属。

13. 六翅木属——*Berrya* Roxb.

Roxb. Hort. Beng. 42. 1814, nom. nud. et in Fl. Ind. **2**: 639.

1832, Descr. Benth. et Hook. f. Gen. pl. **1**: 233. 1862,

乔木;叶互生,心形,5—7 条基出脉,全缘。花多数,白色,细小,排成顶生圆锥花序。花萼钟形,3—5 裂;花瓣 5,匙形;雄蕊多数,分离,全部能育;不具退化雄蕊;子房 3 裂;3 室,每室有胚珠垂生胚珠,柱头 3 裂。蒴果球形;室间 3 片开裂,每裂片有 2 直翅;种子每室 1—2 个,被长毛,胚乳肉质,子叶叶状。


6 种,分布于亚洲热带地区及波利尼西亚。我国台湾产 1 种。

1. 六翅木(台湾植物志) 图版 31

Berrya cordifolia (Willd.) Burret l. c. 606. 1926. — *Espera cordifolia* Willd. in Neue Schrift. Nat.Fr. Berlin. **3**: 449. 1801. — *Berrya ammonilla* Roxb. Hort. Beng. 42. 1814. nom. nud; Flora ind. **2**: 639. 1832 descri Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 383. 1874; Gagnep. in Lecte. Fl. Gen. Indo-Chine **1**: 531. Fig. 53. 1911; T.S. Liu et H. C. Lo in Fl. Taiwan **3**: 694. 1977.

大乔木。叶卵形,长 10—20 厘米,宽 6—8 厘米,先端锐尖,基部心形,无毛,基出脉 7—9 条,中肋有 4 对侧脉,网脉平行,叶柄长约 10 厘米;托叶线形,无毛,长约 2 厘米。圆锥花序顶生,长于 20 厘米,多花,被毛,花梗长 10 毫米。花萼钟形,长 4 毫米,3—5 裂,裂片被毛;花瓣 5,线状匙形,长 8 毫米;雄蕊长 5—6 毫米,子房被毛,花柱短,柱头 3 裂。蒴果球形,有 6 翅,3 室,每室有 1—2 个种子。

产于我国台湾屏东。分布于菲律宾、马来西亚、斯里兰卡、中南半岛等地。



1—6.大翅木 *Berrya cordifolia* (Willd.) Burret: 1.枝条, 2.花瓣, 3.雄蕊, 4.子房切面示胚珠及
胎座, 5.雌蕊, 6.翅果。(谢庆建绘)