

基部心形，裂片三角状圆形，边缘具细锯齿，并极皱缩扭曲，两面无毛至疏被糙伏毛或星状毛，在脉上尤为明显；叶柄瘦弱，长4—7厘米，疏被柔毛。花小，白色，直径约6毫米，单生或几个簇生于叶腋，近无花梗至具极短梗；小苞片3，披针形，长4—5毫米，宽1毫米，疏被糙伏毛；萼浅杯状，5裂，长8—10毫米，裂片三角形，疏被星状柔毛；花瓣5，较萼片略长。果扁球形，径约8毫米，分果片11，网状，具细柔毛；种子肾形，径约1毫米，暗黑色。花期6—9月。

产湖南、四川、贵州、云南、江西、甘肃等省。

我国早在汉代以前即已栽培供蔬食，现在在湖南、四川、江西、贵州、云南等省仍有栽培以供蔬食者；北京、甘肃会宁等地也偶见栽培。其叶圆，边缘折皱曲旋，秀丽多姿，是园林观赏的佳品，地植与盆栽均宜。

3. 圆叶锦葵 野锦葵、金爬齿(山东)，托盘果(江苏)，烧饼花(甘肃) 图版1: 3—4


*Malva rotundifolia* Linn. Sp. Pl. 2: 688, 1753; DC. Prodr. 1: 433, 1824; Maxim. in Act. Hort. Petrop. 2: 78, 1890; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 467, 1911; Liu in Bull. Peking Soc. Nat. Hist. 2(3): 133, 1928; Hsia in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 1: 59, 1931; Pei in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. ser. 9, 182, 1934; 昆明植物研究所，云南植物志 2: 184. 1979.——*Malva neglecta* Wallr. in Syll. Ratish. 1: 140, 1824; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 6, 1955.——*Malva lignescens* Iljin in Not. Syst. Herb. Hort. Bot. Petrop. 2: 173, 1921.

多年生草本，高25—50厘米，分枝多而常匍生，被粗毛。叶肾形，长1—3厘米，宽1—4厘米，基部心形，边缘具细圆齿，偶为5—7浅裂，上面疏被长柔毛，下面疏被星状柔毛；叶柄长3—12厘米，被星状长柔毛；托叶小，卵状渐尖。花通常3—4朵簇生于叶腋，偶有单生于茎基部的，花梗不等长，长2—5厘米，疏被星状柔毛；小苞片3，披针形，长约5毫米，被星状柔毛；萼钟形，长5—6毫米，被星状柔毛，裂片5，三角状渐尖头；花白色至浅粉红色，长10—12毫米，花瓣5，倒心形；雄蕊柱被短柔毛；花柱分枝13—15。果扁圆形，径约5—6毫米，分果片13—15，不为网状，被短柔毛；种子肾形，径约1毫米，被网纹或无网纹。花期夏季。

产河北、山东、河南、山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、四川、贵州、云南、江苏和安徽等省区。生于荒野、草坡。分布至欧洲和亚洲各地。

4. 野葵(湖北) 菟葵(尔雅、图考)，旅葵(古诗)，棋盘菜(湖北)，土黄芪、著葵叶(滇南本草)，芪(茄、芥、其)菜、巴巴叶或把把叶、棋盘叶、冬苋菜(云南、华北经济植物志要误用)

*Malva verticillata* Linn. Sp. Pl. 689, 1753; Cavan. Diss. 2: 78, t. 25, f. 3, 1786; Lour. Fl. Cochinch. 422, 1790; ed. Willd. 514, 1793; Masters in Hook.



1—2. 锦葵 *Malva sinensis* Cavan.: 1.花枝, 2.果片。 3—4. 圆锦叶葵 *M. rotundifolia* Linn.: 3.花, 4.果片。 5—6. 野葵 *M. verticillata* Linn.: 5.花, 6.果片。(李锡畴绘)