

8 毫米,先端具 3 尖。花腋生,单生或近簇生,排列成总状花序式,具叶状苞片,花梗长约 5 毫米,果时延长至 1—2.5 厘米,被星状长硬毛;小苞片杯状,常 6—7 裂,裂片卵状披针形,长 8—10 毫米,密被星状粗硬毛,基部合生;萼钟状,直径 2—3 厘米,5 齿裂,裂片卵状三角形,长 1.2—1.5 厘米,密被星状粗硬毛;花大,直径 6—10 厘米,有红、紫、白、粉红、黄和黑紫等色,单瓣或重瓣,花瓣倒卵状三角形,长约 4 厘米,先端凹缺,基部狭,爪被长髯毛;雄蕊柱无毛,长约 2 厘米,花丝纤细,长约 2 毫米,花药黄色;花柱分枝多数,微被细毛。果盘状,直径约 2 厘米,被短柔毛,分果片近圆形,多数,背部厚达 1 毫米,具纵槽。花期 2—8 月。

本种系原产我国西南地区,全国各地广泛栽培供园林观赏用。全草入药,有清热止血、消肿解毒之功,治吐血、血崩等症。茎皮含纤维可代麻用。世界各国均有栽培供观赏用。

2. 裸花蜀葵

Althaea nudiflora Lindl. in Trans. Hort. Soc. London 7: 251, 1830; Baker in Jour. Bot. Brit. For. 28: 208, 1890; Syn. Malv. 10, 1894; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 10, pl. 15—1, 1955. — *Alcea nudiflora* (Lindl.) Boiss. Fl. Orient. 1: 833, 1867; Iljin in Fl. URSS 15: 108, 1949.

二年生草本,高 80 厘米,被星状疏柔毛。叶轮廓卵形,下部的叶掌状 5—6 裂,裂片卵状长圆形,中裂片长 8—9 厘米,宽 4—6 厘米,上部的叶 3—5 裂,边缘具圆锯齿,基部心形,两面均密被星状糙硬毛;叶柄长 4—10 厘米,被星状疏硬毛。花簇生,排列成顶生总状花序,无叶状苞片,花梗长 1—2 厘米,密被星状糙硬毛;总苞的小苞片杯状,直径约 8 毫米,6—7 裂,裂片正三角形至披针形,长 5 毫米,密被星状绵毛;萼杯状,裂片 5,三角状披针形,长为小苞片的 2 倍,密被星状糙硬毛;花冠白色,基部淡绿黄色,直径 5—8 厘米,花瓣 5 枚,倒卵形,先端凹,基部狭,长 4 厘米,爪具髯毛;雄蕊柱长 10—15 毫米,花丝纤细,花药黄色;花柱分枝多数。果盘状,直径约 1.5 厘米,被短柔毛。花期 7 月。

产我国新疆托里县,海拔 1000 米的山坡向阳处。分布于阿尔泰山。

本种极似蜀葵,但叶的中裂片长,花簇生成顶生总状花序而无叶状苞片,花白色,基部淡绿黄色,而与蜀葵不同。

3. 药蜀葵

Althaea officinalis Linn. Sp. Pl. 686, 1753; DC. Prodr. 1: 436, 1824; Iljin in Fl. URSS 15: 131, 1949.

多年生直立草本,高 1 米,茎密被星状长糙毛。叶卵圆形或心形,3 裂或不分裂,长 3—8 厘米,宽 1.5—6 厘米,先端短尖,基部近心形至圆形,边缘具圆锯齿,两面密被星状绒毛;叶柄长 1—4 厘米,被星状绒毛;总苞的小苞片 9 枚,披针形,长 4 毫米,密被星状糙毛;萼杯状,5 裂,裂片披针形,较苞片为长,密被星状糙毛;花冠直径约 2.5 厘米,淡红色,