

8. 心叶黄花稔(广州植物志) 图版 5: 2—3

Sida cordifolia Linn. Sp. Pl. 684, 1753; Cavan. Diss. 1: 19, t. 3, f. 2, 1785; DC. Prodr. 1: 464, 1824; Benth. Fl. Hongk. 33, 1861; Masters in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 1: 324, 1874; Forbes & Hemsl. in Jour. Linn. Soc. Bot. 23: 85, 1886 (Ind. Fl. Sin. 1); Matsum. & Hayata in Jour. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22: 51, 1906 (Enum. Pl. Formosa); Gagnep. in Lect., Fl. Gén. Indo-Chine 1: 400, 1910; Hayata in Ic. Pl. Formosa 1: 95, 1911; Dunn in Lour. Linn. Soc. Bot. 34: 494, 1911; Dunn & Tutch. in Kew Bull. add. ser. 10, 47, 1912 (Fl. Kwangt. Hongk.); Merr. in Lingn. Sci. Jour. 5: 125, 1928; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 608, 1933; Masam. Fl. Kain. 198, 1943; S. Y. Hu Fl. China Family 153: 16, pl. 5—8—10, 1955; et 15—4; 侯宽昭, 广州植物志 247, 1956; 陈焕镛, 海南植物志 2: 92, 1965; 昆明植物研究所, 云南植物志 2: 197. 图 50: 1—5, 1979.——*Sida herbacea* Cavan. l. c. t. 13, f. 1.——*Sida rotundifolia* Lam. ex Cavan. l. c. t. 3, f. 6.——*Sida hongkongensis* Gandoger in Bull. Soc. Bot. France 71: 629, 1924, nom. subnud.

直立亚灌木, 高约 1 米; 小枝密被星状柔毛并混生长柔毛, 毛长 3 毫米。叶卵形, 长 1.5—5 厘米, 宽 1—4 厘米, 先端钝或圆, 基部微心形或圆, 边缘具钝齿, 两面均密被星状柔毛, 下面脉上混生长柔毛; 叶柄长 1—2.5 厘米, 密被星状柔毛和混生长柔毛; 托叶线形, 长约 5 毫米, 密被星状柔毛。花单生或簇生于叶腋或枝端, 花梗长 5—15 毫米, 密被星状柔毛和混生长柔毛, 上端具节; 萼杯状, 裂片 5, 三角形, 长 5—6 毫米, 密被星状柔毛并混生长柔毛; 花黄色, 直径约 1.5 厘米, 花瓣长圆形, 长 6—8 毫米; 雄蕊柱长约 6 毫米, 被长硬毛。蒴果直径 6—8 毫米, 分果片 10, 顶端具 2 长芒, 芒长 3—4 毫米, 突出于萼外, 被倒生刚毛; 种子长卵形, 顶端具短毛。花期全年。

产台湾、福建、广东、广西、四川和云南等省区。生于山坡灌丛间或路旁草丛中。分布于亚洲和非洲热带和亚热带地区。

9. 湖南黄花稔(云南植物研究)

Sida cordifolioides Feng, 云南植物研究 4 (1): 27, 1982.

直立、多枝亚灌木状草本, 高 40 厘米; 茎和小枝疏被星状柔毛或近于无毛。叶卵形, 长 1.5—4 厘米, 宽 6—22 毫米, 先端钝, 基部心形, 偶有圆形, 具圆锯齿, 上面近无毛或疏被星状柔毛, 下面被星状柔毛; 叶柄长 6—20 毫米, 疏被星状柔毛; 托叶线形, 长约 6 毫米, 被星状柔毛。花单生于叶腋或近簇生, 花梗长 4—7 毫米, 疏被星状柔毛, 近端具节; 萼钟形, 长约 4 毫米, 5 齿裂, 被星状柔毛; 花冠黄色, 直径约 8 毫米, 花瓣倒卵楔形; 雄蕊柱疏被长硬毛。分果片 5, 密被星状柔毛, 端具 2 芒尖, 连芒尖长约 4 毫米。

产湖南省永顺县城附近。



1. 糖叶黄花稔 *Sida subcordata* Span.: 花枝。 2—3. 心叶黄花稔 *Sida cordifolia* Linn.: 2. 叶, 3. 分果片。 4—5. 云南黄花稔 *Sida yunnanensis* S. Y. Hu: 4. 叶, 5. 分果片。 6—7. 长梗黄花稔 *Sida cordata* (Burm. f.) Borss.: 6. 茎枝的毛被, 7. 分果片。(曾孝濂绘)