

齿,果裂成分果片,分果片具锚状倒刺毛。

本族我国有 2 属 3 种 5 变种,引入栽培的 2 变种。

9. 梵天花属——*Urena* Linn.

Linn., Sp. Pl. 692, 1753.

多年生草本或灌木,被星状柔毛。叶互生,圆形或卵形,掌状分裂或深波状。花单生或近簇生于叶腋,或集生于小枝端;小苞片钟形,5 裂;花萼穹窿状,深 5 裂;花瓣 5,外面被星状柔毛;雄蕊柱平截或微齿裂,花药多数,近无柄;子房 5 室,每室具胚珠 1 颗,花柱分枝 10,反曲,柱头盘状,顶端具膝毛。果近球形,分果片(成熟心皮)具钩刺,不开裂,但与中轴分离;种子倒卵状三棱形或肾形,无毛。

本属的模式种:地桃花 *Urena lobata* Linn.

本属约 6 种,分布于两半球的热带和亚热带地区。我国有 3 种 5 变种,产于长江以南各省区。

分种检索表

1. 花单生或近簇生于叶腋间;分果片具倒刺毛和短柔毛。

2. 叶长 5—12 厘米,通常掌状 3—5 浅裂,中央裂片三角形或宽三角形,生于枝上端的叶有时不分裂,常为卵形或披针形;花萼长 5—9 毫米。

3. 叶下部生的近圆形而浅裂,上部生的披针形至长圆形;小苞片和花萼裂片近等长,花瓣长约 15 毫米……………1. 地桃花 *U. lobata* Linn.

3. 叶下部生的卵形而浅裂,上部生的卵形至椭圆形或近圆形;小苞片较萼裂片长或短。

4. 叶下面密被短粗绒毛和绵毛;小苞片密被黄色绵毛……………1b. 粗叶地桃花 *U. lobata* var. *scabriuscula* (DC.) Walp.

4. 叶下面被绒毛和粗硬毛;小苞片被星状疏柔毛。

5. 叶下面星状毛长而纠缠。

6. 叶上面近无毛或被不明显疏柔毛,下面毛被同型,长而柔弱;花瓣长约 1 厘米……………1c. 湖北地桃花 *U. lobata* var. *henryi* S. Y. Hu

6. 叶下面毛被异型,有柔弱的,有粗壮的和伸长的,在脉上簇生长柔毛,叶缘具不整齐齿牙;花瓣长 15—25 毫米……………1d. 云南地桃花 *U. lobata* var. *yunnanensis* S. Y. Hu

5. 叶下面被短星状毛,毛直立而不纠缠……………1e. 中华地桃花 *U. lobata* var. *chinensis* (Osbeck) S. Y. Hu

2. 叶长 1—7 厘米,通常掌状 3—5 深裂,中央裂片倒卵形或近菱形,生于枝上端的叶仅中部浅裂呈葫芦形;花萼长 4—5 毫米。

7. 叶大,长 1.5—7 厘米,被星状短硬毛;花淡红色……………2. 梵天花 *U. procumbens* Linn.

7. 叶小而厚,长 1—2 厘米,密被毡毛状绵毛;花白色……………2b. 小叶梵天花 *U. procumbens* var. *microphylla* Feng

1. 花集生于小枝端,近总状花序;分果片平滑或具条纹……………3. 波叶梵天花 *U. repanda* Roxb.

1. 地桃花 (广东、广西、江西、贵州) 肖梵天花 (广州植物志), 野棉花 (浙江、湖北、