

本种的树干上可采取树胶,叫做“梧桐胶”或称卡拉雅胶 (*Karaya gum*), 可用于食品、纺织、医药、香烟等工业。树皮的纤维可制绳索和作造纸的原料。

4. 凹脉苹婆 (植物分类学报)

Sterculia impressinervis Hsue in Acta Phytotax. Sinica 15(1): 82. fig. 5. 1977.

乔木或灌木,小枝干时灰褐色,幼嫩部分被稀疏的星状短柔毛。叶薄革质,椭圆状倒披针形,长7—17厘米,宽6—9.5厘米,顶端尾状或尾状渐尖,基部钝形,全缘但有不明显的波状,上面无毛,下面几无毛但在主脉和侧脉上被稀疏的淡黄褐色短柔毛,侧脉每边14—16条,上举且弯拱;全部叶脉尤其网脉在上面均明显凹陷,在下面均明显凸出,叶脉干时紫红褐色,叶柄长3—6.5厘米,两端膨大,略被稀疏的短柔毛;托叶卵形,被毛,顶端急尖,早落。蓇葖果干时紫红色,矩圆形,长5.5厘米,宽1.5—1.8厘米,顶端有长1—1.2厘米的喙,密被紫褐色星状茸毛,每蓇葖有种子4—5个;种子圆球形或略带肾形,紫红色,直径约1厘米。

产云南东南部麻栗坡。

5. 膜萼苹婆 (植物分类学报)

Sterculia hymenocalyx K. Schum. in Engler Bot. Jahrb. 24. Beibl. 58. p. 18. 1897; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 467—468. 1911.

灌木;小枝被星状短柔毛,顶端着生几个假轮生的叶,并有多数宿存的芽鳞;芽鳞条状披针形,长5—15毫米,被有分枝的淡黄褐色毛,比叶柄长。叶纸质或薄革质,倒卵形或倒卵状披针形,长24—37厘米,宽9—13厘米,顶端钝或钝状渐尖,基部下延,楔形或钝形,干时暗绿色,上面无毛,下面除在主脉和侧脉上有很稀疏的星状毛外均无毛,侧脉约16—24对,向上弯拱;叶柄长8—10毫米,被毛;托叶同密生的芽鳞混生在一起。圆锥花序柔弱,顶生或腋生,长5—10厘米,被红黄色毛,花梗柔弱;小苞片条形,锥尖状,长5—7毫米,早落;萼淡白色或粉红色,长达16毫米,5裂,外面有毛,内面无毛,裂片长12毫米,顶端不粘合,开展如星状,萼筒长约3毫米;雄花的雌雄蕊柄无毛,反曲,长7毫米;雌花的子房圆球形,无柄,密被毛,花柱反曲,被毛,与子房等长,柱头波状5浅裂,每心皮有胚珠5—8个。蓇葖果3—5个集生,有细长的柔弱的果柄,厚纸质,略似纺锤状,长5—8厘米,未开裂前宽约2厘米,顶端和基部均渐狭,外面密被红黄色绒毛,内面无毛;种子椭圆形,直径约1厘米。果期5月。

产云南河口。生于海拔180—270米的山腰上。越南也有分布。

6. 苹婆 (南海志) 凤眼果 (广州),七姐果 (广州) 图版 33: 1—3

Sterculia nobilis Smith in Rees's Cyclop. no 4. 1816; Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 358. 1874; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 472. 1911; 侯宽昭等,广州植物志 236—237,图 113, 1956; 陈焕镛等,海南植物志 2: 73,