

1965; 中国高等植物图鉴 2: 824, 图 3377, 1972.

乔木, 树皮褐黑色, 小枝幼时略有星状毛。叶薄革质, 矩圆形或椭圆形, 长 8—25 厘米, 宽 5—15 厘米, 顶端急尖或钝, 基部浑圆或钝, 两面均无毛; 叶柄长 2—3.5 厘米, 托叶早落。圆锥花序顶生或腋生, 柔弱且披散, 长达 20 厘米, 有短柔毛; 花梗远比花长; 萼初时乳白色, 后转为淡红色, 钟状, 外面有短柔毛, 长约 10 毫米, 5 裂, 裂片条状披针形, 先端渐尖且向内曲, 在顶端互相粘合, 与钟状萼筒等长; 雄花较多, 雌雄蕊柄弯曲, 无毛, 花药黄色; 雌花较少, 略大, 子房圆球形, 有 5 条沟纹, 密被毛, 花柱弯曲, 柱头 5 浅裂。蓇葖果鲜红色, 厚革质, 矩圆状卵形, 长约 5 厘米, 宽约 2—3 厘米, 顶端有喙, 每果内有种子 1—4 个; 种子椭圆形或矩圆形, 黑褐色, 直径约 1.5 厘米。花期 4—5 月, 但在 10—11 月常可见少数植株开第二次花。

产广东、广西的南部、福建东南部、云南南部和台湾。广州附近和珠江三角洲多有栽培。喜生于排水良好的肥沃的土壤, 且耐荫蔽。印度、越南、印度尼西亚也有分布, 多为人工栽培。

苹婆的种子可食, 煮熟后味如栗子, 惜结实率不高; 如能注意选育种, 提高结实率, 是一种值得提倡的木本粮食植物。

本种繁殖容易, 用大枝扦插亦易成活。树冠浓密, 叶常绿, 树形美观, 不易落叶, 也是一种很好的行道树。广州人喜取其叶以裹粽。

古称“罗望子”和“罗晃子”实为苹婆。

7. 小花苹婆 (植物分类学报) 图版 33: 4—7


Sterculia micrantha Chun & Hsue in Journ. Arnold Arb. 28: 328—329. 1947.

乔木, 小枝粗壮, 具广阔的髓部和大叶痕。叶矩圆状卵形, 长 7—14 厘米, 宽 3.5—6.5 厘米, 顶端钝或短尖, 基部钝, 上面几无毛, 下面沿叶脉散生星状茸毛; 侧脉 12 对; 叶柄长 3—8 厘米, 略有星状毛。圆锥花序柔弱, 长约 26 厘米; 花梗长 3—4 毫米, 有关节; 萼白色, 钟状, 甚薄, 长 5—6 毫米, 5 裂, 外面略有短柔毛, 内面除近裂片处均无毛, 但有乳头状突起, 裂片三角状披针形, 与萼筒等长, 边缘有浓毛; 雄花的雌雄蕊柄柔弱, 长 3 毫米, 无毛, 花药 10 个; 雌花有长约 1.5 毫米的雌雄蕊柄, 子房圆球形, 被柔毛。果实未见。花期 10 月。

产云南南部景东县。生于海拔 1400 米的疏林中。

8. 大叶苹婆 (植物分类学报)

Sterculia kingtungensis Hsue in Acta Phytotax. Sinica 15(1): 74. 1977.
——*Sterculia megaphylla* Tsai & Mao in Acta Phytotax. Sinica 9(2): 199—202. 1964, non Bur. & Poiss. ex Guillaumin in Ann. Mus. Col Marseille, Ser. II. 9: 104. 1911.



1—3. 草蓼 *Sterculia nobilis* Smith: 1.果枝, 2.雄花, 3.雄花切面示雄蕊。4—7. 小花草蓼 *Sterculia micrantha* Chun & Hsueh: 4.花枝, 5.雄花, 6.雌花, 7.雌蕊。8—10. 信宜草蓼 *Sterculia subracemosa* Chun & Hsueh: 8.花枝, 9.两性花, 10.花切面示雌蕊和雄蕊。(黄少容绘)