

1965; 中国高等植物图鉴 2: 824, 图 3377, 1972.

乔木, 树皮褐黑色, 小枝幼时略有星状毛。叶薄革质, 矩圆形或椭圆形, 长 8—25 厘米, 宽 5—15 厘米, 顶端急尖或钝, 基部浑圆或钝, 两面均无毛; 叶柄长 2—3.5 厘米, 托叶早落。圆锥花序顶生或腋生, 柔弱且披散, 长达 20 厘米, 有短柔毛; 花梗远比花长; 萼初时乳白色, 后转为淡红色, 钟状, 外面有短柔毛, 长约 10 毫米, 5 裂, 裂片条状披针形, 先端渐尖且向内曲, 在顶端互相粘合, 与钟状萼筒等长; 雄花较多, 雌雄蕊柄弯曲, 无毛, 花药黄色; 雌花较少, 略大, 子房圆球形, 有 5 条沟纹, 密被毛, 花柱弯曲, 柱头 5 浅裂。蓇葖果鲜红色, 厚革质, 矩圆状卵形, 长约 5 厘米, 宽约 2—3 厘米, 顶端有喙, 每果内有种子 1—4 个; 种子椭圆形或矩圆形, 黑褐色, 直径约 1.5 厘米。花期 4—5 月, 但在 10—11 月常可见少数植株开第二次花。

产广东、广西的南部、福建东南部、云南南部和台湾。广州附近和珠江三角洲多有栽培。喜生于排水良好的肥沃的土壤, 且耐荫蔽。印度、越南、印度尼西亚也有分布, 多为人工栽培。

苹婆的种子可食, 煮熟后味如栗子, 惜结实率不高; 如能注意选育种, 提高结实率, 是一种值得提倡的木本粮食植物。

本种繁殖容易, 用大枝扦插亦易成活。树冠浓密, 叶常绿, 树形美观, 不易落叶, 也是一种很好的行道树。广州人喜取其叶以裹粽。

古称“罗望子”和“罗晃子”实为苹婆。

7. 小花苹婆 (植物分类学报) 图版 33: 4—7

Sterculia micrantha Chun & Hsue in Journ. Arnold Arb. 28: 328—329. 1947.

乔木, 小枝粗壮, 具广阔的髓部和大叶痕。叶矩圆状卵形, 长 7—14 厘米, 宽 3.5—6.5 厘米, 顶端钝或短尖, 基部钝, 上面几无毛, 下面沿叶脉散生星状茸毛; 侧脉 12 对; 叶柄长 3—8 厘米, 略有星状毛。圆锥花序柔弱, 长约 26 厘米; 花梗长 3—4 毫米, 有关节; 萼白色, 钟状, 甚薄, 长 5—6 毫米, 5 裂, 外面略有短柔毛, 内面除近裂片处均无毛, 但有乳头状突起, 裂片三角状披针形, 与萼筒等长, 边缘有浓毛; 雄花的雌雄蕊柄柔弱, 长 3 毫米, 无毛, 花药 10 个; 雌花有长约 1.5 毫米的雌雄蕊柄, 子房圆球形, 被柔毛。果实未见。花期 10 月。

产云南南部景东县。生于海拔 1400 米的疏林中。

8. 大叶苹婆 (植物分类学报)

Sterculia kingtungensis Hsue in Acta Phytotax. Sinica 15(1): 74. 1977.
——*Sterculia megaphylla* Tsai & Mao in Acta Phytotax. Sinica 9(2): 199—202. 1964, non Bur. & Poiss. ex Guillaumin in Ann. Mus. Col Marseille, Ser. II. 9: 104. 1911.

乔木，高7—10米，树皮褐色；小枝粗壮，圆柱状，具大的叶痕。叶大，纸质，集生于小枝的顶端，椭圆状矩圆形，长28厘米，宽14厘米，顶端突然短渐尖，基部圆楔形，两面均无毛；侧脉约17对，平行，在下面隆起，网脉稀疏；叶柄细长，长6—7厘米，有沟槽，几无毛；托叶条形，长1厘米，无毛。圆锥花序密集，集生于小枝顶端，长12厘米，散生铁锈色小柔毛；花梗纤细，有关节；萼红色，钟状，5裂，裂片披针形，向内弯，顶端互相粘合，外面被微柔毛，内面具乳头状突起，边缘有缘毛，长6毫米，稍长于钟状的萼筒；雌雄蕊柄细弱，弯曲，长4毫米，无毛，花药10个。果实未见。花期4—5月。

产云南景东县。生于海拔1600米的河边。

9. 信宜苹婆 (植物分类学报) 图版 33: 8—10

Sterculia subracemosa Chun & Hsue in Journ. Arnold Arb. 28: 328. 1947.

灌木，高3.5米；小枝柔弱，干时红褐色，被稀疏的星状短柔毛。叶倒披针形或椭圆状倒卵形，长11—18厘米，宽4—6.5厘米，顶端钝或有短急尖，基部急尖或楔形，两面均无毛，侧脉8—10对，近边缘互相连结，网脉在两面都很明显；叶柄长1.5—2.5厘米，略被短柔毛；叶及叶柄常散生小黑点。总状花序柔弱，长约9厘米，密被淡黄褐色短柔毛；花梗长8—10毫米；小苞片条状披针形，长2毫米；花白带粉红色或橙红色；萼长13毫米，5裂，外面被短柔毛，内面除裂片的上部外均无毛，裂片卵状披针形，比钟状萼筒略长，边缘略被毛；雄花的雌雄蕊柄纤细；雌花的花药约17个，着生在子房基部，子房圆球形，直径约1.5毫米，密被短柔毛，花柱被毛，柱头5裂。果未见。花期3—4月。

产广东信宜和广西龙津大青山。生于海拔550米的山谷和山坡密林中。

10. 台湾苹婆 (植物分类学报)

Sterculia ceramica R. Brown in Benn. Pl. Jav. Rar. 233. 1844; Li Woody Fl. Taiw. 569. 1963.—*Sterculia luzonica* Warb. in Perk. Frag. Fl. Philip. 115. 1904; Hayata Icon. Pl. Form. 3: 47. 1913.

小乔木。叶纸质或薄革质，卵形或椭圆状卵形，长8—17厘米，宽7—9厘米，顶端渐尖或急尖，基部心形，全缘，两面均无毛或在下面的基生脉腋间有少许淡黄褐色星状短柔毛，基生脉5—7条；叶柄长3—5厘米，略被毛。聚伞状圆锥花序腋生；花梗长约11毫米；雄花的萼椭圆形，长约5毫米，5浅裂，裂片三角形，顶端急尖；雌雄蕊柄很短，无毛，花药30—40个聚生成头状；雌花的萼坛状，长5.5毫米，5浅裂，裂片为萼全长的1/3，向外开展；子房5室，有5纵沟，密被短柔毛，花柱很短，柱头5个，球形。蓇葖果厚革质，卵状镰刀形，长3—6厘米，宽2.5—3厘米，顶端钝，外面被红褐色毛，每蓇葖通常有种子2个；种子近椭圆形，长1.5—2厘米。花期6月。

产我国台湾红头屿。菲律宾群岛也有分布。

11. 粉苹婆 (中国树木分类学)