

部,萼片狭三角状披针形,长7毫米,中部以下宽2.5毫米,外面被黄褐色短柔毛,内面几无毛;雌雄蕊柄弯曲,无毛,顶端聚生花药10个。雌花和果实未见。花期3月。

产云南屏边海拔900米的疏林中。

14. 屏边苹婆(植物分类学报)

Sterculia pinbienensis Tsai & Mao in Acta Phytotax. Sinica 9 (2): 198—200. 1964.

灌木,小枝幼时密被星状短柔毛。叶纸质,椭圆形或椭圆状倒披针形,长10—22厘米,宽4—9厘米,顶端短渐尖,基部楔形而急尖,上面暗绿色,无毛,下面灰色并被灰褐色星状短柔毛,侧脉10—13对;叶柄粗壮,长2—3厘米,密被黄褐色毛;托叶条状披针形,长6毫米。圆锥花序腋生,被黄褐色微柔毛;小苞片条形,长2.5厘米;花梗长6—8毫米;雄花的花萼粉红色,萼5裂几达基部,萼片狭三角状披针形,长1.2厘米,外面密被星状短柔毛,内面近于无毛;雄花的雌雄蕊柄弯曲,无毛,顶端聚生花药约10个;雌花的子房圆球形,密被黄白色短茸毛,花柱反曲,被微柔毛,柱头膨大。蓇葖果椭圆形,长4—5厘米,宽1.5厘米,密被红褐色短茸毛;种子矩圆形,黑褐色,长约1.1厘米。花期4月。

产云南屏边和广西宁明。生于海拔1000—1050米的山谷中和山顶密林中。

15. 河口苹婆(植物分类学报)

Sterculia scandens Hemsl. in Kew Bull. 1908: 179. 1908; Merr. in Journ. Arnold Arb. 19: 52. 1930.

灌木;小枝甚直,有沟纹,几无毛。叶纸质,长椭圆状矩圆形或披针形,长15—45厘米,宽12—18厘米,顶端渐尖或尾状急尖,基部圆形或钝,两面均光滑无毛,干时青绿色,侧脉17—20对,在近叶缘互相联结,网脉在两面均明显凸出;叶柄在两端略膨大,长5—12厘米,无毛。圆锥花序腋生,柔弱,长10—34厘米,略被柔毛;花少且疏生,小苞片条形,长约3毫米,早落;花梗柔弱,长0.5—1厘米;萼5裂几至基部,萼片条状披针形,长约2厘米,顶端渐尖并互相粘合,两面均被星状柔毛;雄花的雌雄蕊柄细长,向下弯曲,无毛,顶端聚生花药约10个;雌花的子房圆球形,密被淡黄白色茸毛,花柱弯曲,雌雄蕊柄无毛。果实未见。

产云南河口。越南老街海拔120米的山谷中也有分布。

本种的叶特大,两面光滑无毛,花疏生,易于识别,萼片在开花后常可增大。本种前被人误称为藤本。

16. 绿花苹婆(植物分类学报)

Sterculia gengmaensis Hsue in Acta Phytotax. Sinica 15 (1): 74. 1977.
——*Sterculia viridiflora* Tsai & Mao in Acta Phytotax. Sinica 9 (2): 199—201. 1964, non W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W. Austral. 3: 177. 1918.

灌木,小枝幼时被灰褐色绒毛。叶膜质,椭圆形或倒披针状椭圆形,长11—23厘米,