

宽4—10厘米,顶端急尖,基部渐狭成楔形而钝圆,两面均无毛,侧脉约12—14对,在两面均凸出,网脉稀疏;叶柄长1.5—3厘米,顶端不膨大,被黄褐色短柔毛;托叶披针形,长4毫米。总状花序近顶生,被红褐色微柔毛;花梗长6毫米,有关节;花绿色,萼5裂几至基部,萼片三角状披针形,在顶端互相粘合,长8毫米,两面均近于无毛或在顶端被较少的细长毛;雌雄蕊柄被绒毛。果未见。

产云南耿马海拔1670米的森林中。

17. 蒙自苹婆(植物分类学报)

Sterculia henryi Hemsl. in Kew Bull. 1908: 179. 1908; Tardieu-Blot in Humbert Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 405. f. 45: 5—6. 1945.

17a. 蒙自苹婆(原变种) 图版34: 1—2

S. henryi Hemsl. var. *henryi*

灌木或小乔木,高1—5米,嫩枝密被黄褐色短柔毛。叶纸质,矩圆形或披针状矩圆形,长14—25厘米,宽4—6厘米,顶端渐尖,基部圆形,两面均无毛,侧脉约15对,弯拱,在近叶缘互相连结,叶脉在下面明显凸出;叶柄长2.5—5厘米。总状花序腋生,长5—15厘米,被黄褐色毛;小苞片条状披针形,与花梗等长,花梗长0.5—1厘米;萼5裂几至基部,红色,长1—1.5厘米,萼片狭三角形,宽3—4毫米,外面被黄褐色星状毛,内面无毛,顶端互相粘合;雄花的雌雄蕊柄长约4毫米,向下弯曲,无毛;雌花的子房卵形,密被毛,长约4—6毫米;花柱弯曲,被毛。果未见。

产云南蒙自。生于海拔1500米的森林中。越南也有分布。

本种的萼片在开花后常可增大。

17b. 大围山苹婆(植物分类学报)(变种)

S. henryi Hemsl. var. *cuneata* Chun & Hsue in Arnold Arb. 28: 329. 1947.

本变种叶的基部楔形或急尖,可与原变种区别。花期3—4月。

本变种产云南屏边大围山。生于海拔800—1000米的山坡上疏林中和山谷溪旁密林中。

18. 基苹婆(植物分类学报)

Sterculia principis Gagnep. in Lecte. Not. Syst. 1: 82. 1909; et in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 468. 1911; Craib Fl. Siam. Enum. 1: 169. 1925.

灌木,小枝幼时有星状短柔毛。叶椭圆形或条状椭圆形,长16—28厘米,宽4—8.5厘米,顶端长渐尖并有细的突起,基部近圆形,两面均无毛或在下面有极少的星状短柔毛,基生脉5条,侧脉7—10对;叶柄长4—6厘米,叶柄和叶的下面常有黑褐色的乳头状小斑点;托叶三角形,长7—10毫米。花序为总状花序或少分枝的圆锥花序,腋生,花疏生;萼5裂几至基部,长10—12毫米,外面略有毛,内面无毛但有稀疏的斑点,萼片条状披针形,顶端长渐尖并互相粘合,边缘有缘毛;雄花的雌雄蕊柄无毛,弯曲;雌花的雌雄蕊柄很短,

有毛,花柱略被毛,柱头5裂。花期3月。

产云南金平。生于海拔1600—1700米的山坡上。老挝、缅甸、泰国也有分布。

19. **短柄苹婆** (植物分类学报) 图版34: 3

Sterculia brevissima Hsue in *Acta Phytotax. Sinica* 15 (1): 74. 1977.
—***Sterculia brevipetiolata*** Tsai & Mao in *Acta Phytotax. Sinica* 9(2): 199—202. 1964, non Merr. in *Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* 35: 40. 1905.

小乔木或灌木;小枝的幼嫩部分被黄褐色茸毛。叶集生于小枝顶端,纸质,倒披针形或倒披针状狭椭圆形,长15—30厘米,宽4—7厘米,顶端渐尖或钝状急尖,基部逐渐变狭而尖锐,两面均无毛;叶柄短,几无柄或有长0.6—1.2厘米的短柄,被灰褐色短柔毛;托叶披针形,长7毫米。花序柔弱,为总状花序或圆锥花序,腋生且下垂;小苞片条状披针形,长7毫米,与花梗等长;花粉红色,中部以下紫色;萼5裂几至基部,萼片椭圆状披针形,长约8毫米,宽3毫米,长于钟状萼筒3倍,被稀疏的星状柔毛;雌雄蕊柄细长,弯曲,长4.5毫米;子房圆球形,密被茸毛,花柱反曲。蓇葖果椭圆形,红褐色,两端渐狭,长8厘米,宽2厘米,外面密被短柔毛;果柄长3厘米。种子圆球形,褐色,直径约1厘米。花期4月。

产云南西双版纳。生于海拔540—1300米的山谷和山坡上的混交林中或沟谷雨林中。

本种的叶几无柄,倒披针形,叶集生于小枝顶端,易与别种相区别。

20. **罗浮苹婆** (植物分类学报) 图版35

Sterculia subnobilis Hsue in *Acta Phytotax. Sinica* 15 (1): 82. fig. 6. 1977.

乔木,嫩枝略被短柔毛。叶椭圆形,长17—28厘米,宽8—13厘米,顶端有钝的短尖,基部近圆形或略呈浅心形,两面均无毛,或幼时在下面略被很稀疏的短柔毛,侧脉6—9对,常有5条比较明显的基生脉;叶柄长2—5厘米,几无毛。圆锥花序腋生,疏散,长10—18厘米,略被毛;花梗纤细,长约1厘米;花初时粉绿色,后变为红色,直径达18毫米;萼分裂几至基部,裂片向外开展,条状披针形,长8毫米,先端长渐尖,两面均被稀疏的短柔毛,边缘有缘毛;雄花的雌雄蕊柄无毛,花药约15个;雌花的子房具短柄,圆球形,密被黄褐色茸毛,花柱向下弯,有毛。花期4月。

产广东(博罗罗浮山、宝安梧桐山)和广西扶绥县。生于海拔1025米的山坡上。

本种的叶与苹婆 *S. nobilis* Smith 相似,但本种的花序上的花散生,萼分裂几至基部;在有些特征上本种与假苹婆 *S. lanceolata* Cav. 也相似,但本种萼的裂片是条状披针形,先端长渐尖,不是钝形,以及本种的叶的基部常有5条比较明显的基生脉,可以区别。

21. **假苹婆** (广东) 鸡冠木(茂名),赛苹婆(中国树木分类学) 图版36: 1—4