

有毛,花柱略被毛,柱头5裂。花期3月。

产云南金平。生于海拔1600—1700米的山坡上。老挝、缅甸、泰国也有分布。

19. **短柄苹婆** (植物分类学报) 图版34: 3

Sterculia brevissima Hsue in *Acta Phytotax. Sinica* 15 (1): 74. 1977.
—***Sterculia brevipetiolata*** Tsai & Mao in *Acta Phytotax. Sinica* 9(2): 199—202. 1964, non Merr. in *Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* 35: 40. 1905.

小乔木或灌木;小枝的幼嫩部分被黄褐色茸毛。叶集生于小枝顶端,纸质,倒披针形或倒披针状狭椭圆形,长15—30厘米,宽4—7厘米,顶端渐尖或钝状急尖,基部逐渐变狭而尖锐,两面均无毛;叶柄短,几无柄或有长0.6—1.2厘米的短柄,被灰褐色短柔毛;托叶披针形,长7毫米。花序柔弱,为总状花序或圆锥花序,腋生且下垂;小苞片条状披针形,长7毫米,与花梗等长;花粉红色,中部以下紫色;萼5裂几至基部,萼片椭圆状披针形,长约8毫米,宽3毫米,长于钟状萼筒3倍,被稀疏的星状柔毛;雌雄蕊柄细长,弯曲,长4.5毫米;子房圆球形,密被茸毛,花柱反曲。蓇葖果椭圆形,红褐色,两端渐狭,长8厘米,宽2厘米,外面密被短柔毛;果柄长3厘米。种子圆球形,褐色,直径约1厘米。花期4月。

产云南西双版纳。生于海拔540—1300米的山谷和山坡上的混交林中或沟谷雨林中。

本种的叶几无柄,倒披针形,叶集生于小枝顶端,易与别种相区别。

</



1—2. 蒙自苹婆 *Sterculia henryi* Hemsl.: 1. 花枝, 2. 花。 3. 短柄苹婆 *Sterculia brevissima* Hsue: 的果枝。(黄少容, 徐颂芬绘)