

有毛,花柱略被毛,柱头5裂。花期3月。

产云南金平。生于海拔1600—1700米的山坡上。老挝、缅甸、泰国也有分布。

19. **短柄苹婆** (植物分类学报) 图版34: 3

Sterculia brevissima Hsue in *Acta Phytotax. Sinica* 15 (1): 74. 1977.
—***Sterculia brevipetiolata*** Tsai & Mao in *Acta Phytotax. Sinica* 9(2): 199—202. 1964, non Merr. in *Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* 35: 40. 1905.

小乔木或灌木;小枝的幼嫩部分被黄褐色茸毛。叶集生于小枝顶端,纸质,倒披针形或倒披针状狭椭圆形,长15—30厘米,宽4—7厘米,顶端渐尖或钝状急尖,基部逐渐变狭而尖锐,两面均无毛;叶柄短,几无柄或有长0.6—1.2厘米的短柄,被灰褐色短柔毛;托叶披针形,长7毫米。花序柔弱,为总状花序或圆锥花序,腋生且下垂;小苞片条状披针形,长7毫米,与花梗等长;花粉红色,中部以下紫色;萼5裂几至基部,萼片椭圆状披针形,长约8毫米,宽3毫米,长于钟状萼筒3倍,被稀疏的星状柔毛;雌雄蕊柄细长,弯曲,长4.5毫米;子房圆球形,密被茸毛,花柱反曲。蓇葖果椭圆形,红褐色,两端渐狭,长8厘米,宽2厘米,外面密被短柔毛;果柄长3厘米。种子圆球形,褐色,直径约1厘米。花期4月。

产云南西双版纳。生于海拔540—1300米的山谷和山坡上的混交林中或沟谷雨林中。

本种的叶几无柄,倒披针形,叶集生于小枝顶端,易与别种相区别。

20. **罗浮苹婆** (植物分类学报) 图版35

Sterculia subnobilis Hsue in *Acta Phytotax. Sinica* 15 (1): 82. fig. 6. 1977.

乔木,嫩枝略被短柔毛。叶椭圆形,长17—28厘米,宽8—13厘米,顶端有钝的短尖,基部近圆形或略呈浅心形,两面均无毛,或幼时在下面略被很稀疏的短柔毛,侧脉6—9对,常有5条比较明显的基生脉;叶柄长2—5厘米,几无毛。圆锥花序腋生,疏散,长10—18厘米,略被毛;花梗纤细,长约1厘米;花初时粉绿色,后变为红色,直径达18毫米;萼分裂几至基部,裂片向外开展,条状披针形,长8毫米,先端长渐尖,两面均被稀疏的短柔毛,边缘有缘毛;雄花的雌雄蕊柄无毛,花药约15个;雌花的子房具短柄,圆球形,密被黄褐色茸毛,花柱向下弯,有毛。花期4月。

产广东(博罗罗浮山、宝安梧桐山)和广西扶绥县。生于海拔1025米的山坡上。

本种的叶与苹婆 *S. nobilis* Smith 相似,但本种的花序上的花散生,萼分裂几至基部;在有些特征上本种与假苹婆 *S. lanceolata* Cav. 也相似,但本种萼的裂片是条状披针形,先端长渐尖,不是钝形,以及本种的叶的基部常有5条比较明显的基生脉,可以区别。

21. **假苹婆** (广东) 鸡冠木(茂名),赛苹婆(中国树木分类学) 图版36: 1—4



罗浮草婆 *Sterculia subnobilis* Hsue: 1.花枝, 2.雄花, 3.雌花。
(黄少容绘)