

小。果木质或革质,有龙骨状突起或翅,不开裂;种子无胚乳。

本属模式种:银叶树 *Heritiera littoralis* Dryand.

本属约有 35 种,分布于非洲、亚洲和大洋洲的热带地区。我国有 3 种,产于广东、台湾和云南。

## 分 种 检 索 表

1. 果革质,上端有鱼尾状的长翅,翅长 2—4 厘米;花白色……………1. 蝴蝶树 *H. parvifolia* Merr.
1. 果木质,有龙骨状突起或长约 1 厘米的短翅,花红色或红褐色。
  2. 果具龙骨状突起,花药 4—5 枚排成一环,叶柄长不及 2 厘米……………2. 银叶树 *H. littoralis* Dryand.
  2. 果具长约 1 厘米的短翅,花药 8—10 枚排成二环,叶柄长 2—9 厘米……………3. 长柄银叶树 *H. angustata* Pierre

### 1. 蝴蝶树(海南) 图版 39: 6—10

*Heritiera parvifolia* Merr. in Journ. Arnold Arb. 6: 137. 1925.——*Tarrietia parvifolia* (Merr.) Merr. & Chun in Sunyatsenia 2: 281. 1935; 陈焕镛等,海南植物志 2: 76, 图 328, 1965; 中国高等植物图鉴 2: 825, 图 3380, 1972.


常绿乔木,高达 30 米,树皮灰褐色,小枝密被鳞秕。叶椭圆状披针形,长 6—8 厘米,宽 1.5—3 厘米,顶端渐尖,基部短尖或近圆形,上面无毛,下面密被银白色或褐色鳞秕,侧脉约 6 对;叶柄长 1—1.5 厘米。圆锥花序腋生,密被锈色星状短柔毛;花小,白色,萼长约 4 毫米,5—6 裂,两面均有星状短柔毛,裂片矩圆状卵形,长 1.5—2 毫米;雄花的雌雄蕊柄长约 1 毫米,花盘厚,直径约 0.8 毫米,围绕在雌雄蕊柄的基部,花药 8—10 个,排成 1 环,有不发育的雌蕊;雌花的子房长约 2 毫米,被毛,不育花药位于子房基部。果有长翅,长 4—6 厘米,含种子的部分仅长 1—2 厘米,翅鱼尾状,顶端钝,宽约 2 厘米,密被鳞秕,果皮革质;种子椭圆形。花期 5—6 月。

产广东海南岛,为海南岛特产。生于保亭、崖县、乐东等县,为五指山一带山地热带雨林的主要树种,常为最上层树种,有明显的板状干基。木材暗红色,质硬,为优良的造船材。

### 2. 银叶树(中国树木分类学) 图版 39: 1—5

*Heritiera littoralis* Dryand. in Ait. Hort. Kew. 3: 546. 1789; Benth. Fl. Hongk. 36. 1861; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 485. 1911; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 9: 40. 1930; 陈焕镛等,海南植物志 2: 76—77, 1965; 中国高等植物图鉴 2: 826, 图 3381, 1972.

常绿乔木,高约 10 米;树皮灰黑色,小枝幼时被白色鳞秕。叶革质,矩圆状披针形、椭圆形或卵形,长 10—20 厘米,宽 5—10 厘米,顶端锐尖或钝,基部钝,上面无毛或几无毛,下面密被银白色鳞秕;叶柄长 1—2 厘米;托叶披针形,早落。圆锥花序腋生,长约 8 厘米,



1—5. 银叶树 *Heritiera littoralis* Dryand.: 1.花枝, 2.花, 3.花切面示雄蕊, 4.雄蕊放大, 5.果枝。  
 6—10. 蝴蝶树 *Heritiera parvifolia* Merr.: 6.花枝, 7.花, 8.雄蕊, 9.雌蕊, 10.果。11—14. 长柄银叶树 *Heritiera angustata* Pierre: 11.花枝, 12.花, 13.雄蕊, 14.果。(黄少容绘)