

密被星状毛和鳞秕；花红褐色；萼钟状，长4—6毫米，两面均被星状毛，5浅裂，裂片三角形，长约2毫米；雄花的花盘较薄，有乳头状突起，雌雄蕊柄短而无毛，花药4—5个在雌雄蕊柄顶端排成一环；雌花的心皮4—5枚，柱头与心皮同数且短而向下弯。果木质，坚果状，近椭圆形，光滑，干时黄褐色，长约6厘米，宽约3.5厘米，背部有龙骨状突起；种子卵形，长2厘米。花期夏季。

产广东(台山、崖县和沿海岛屿)、广西防城和台湾。印度、越南、柬埔寨、斯里兰卡、菲律宾和东南亚各地以及非洲东部、大洋洲均有分布。

本种为热带海岸红树林的树种之一。木材坚硬，为建筑、造船和制家具的良材。果木质，内有厚的木栓状纤维层，故能漂浮在海面而散布到各地。

3. 长柄银叶树(海南植物志) 白楠(海南)，白符公(海南崖县)，大叶银叶树(广州植物志) 图版39: 11—14

Heritiera angustata Pierre Fl. For. Cochinch. fasc. 13: t. 204 c. 1889; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 485. 1911; Kosterm. in Reinwardtia 4: 504. 1959 et 5 (4): 378. 1961; 陈焕镛等，海南植物志 2: 77, 1965; 中国高等植物图鉴 2: 826, 1972.——*Heritiera macrophylla* auct. non Wall. ex Voigt, Merr. in Lingn. Sci. Journ. 14: 38. 1935; 侯宽昭等，广州植物志 238. 1956.


常绿乔木，高达12米，树皮灰色，小枝幼时被柔毛。叶革质，矩圆状披针形，全缘，长10—30厘米，宽5—15厘米，顶端渐尖或钝，基部尖锐或近心形，上面无毛，下面被银白色或略带金黄色的鳞秕；叶柄长2—9厘米；托叶条状披针形，早落。圆锥花序顶生或腋生，花红色；萼坛状，长约6毫米，宽2.5—4毫米，4—6浅裂，两面均被星状柔毛，裂片三角形；雄花的雌雄蕊柄长2—3毫米，花药8—12个群集在雌雄蕊柄顶端排成2环；雌花较少，且比雄花短，不育花药4—10枚围绕在子房基部；子房圆球形，略有5棱，被短柔毛，花柱短，柱头5个。果为核果状，坚硬，椭圆形，褐色，长约3.5厘米，顶端有长约1厘米的翅；种子卵圆形。花期6—11月。

产广东海南岛东南部和云南。生于山地或近海岸附近。柬埔寨也有分布。本种的心材灰褐色，结构细密，质坚而重，不受虫蛀，耐水浸泡，为做船板的良材。

6. 鹧鸪麻属——*Kleinhovia* Linn.

Linn. Sp. Pl. ed. 2, 1365. 1763.

乔木。叶卵形，全缘，基部有掌状脉3—7条。聚伞花序作圆锥花序式排列，顶生，花两性；小苞片细小，披针形；萼片5枚，分离；花瓣5片，互不相等；雄蕊的花丝大部分合生成管状，并与子房柄完全贴生而形成雌雄蕊柄，雄蕊管的上部扩大成坛状，包围雌蕊，顶端分成5束，每一束具花药3个，花药2室，药室略有分歧，退化雄蕊尖齿状，甚短，与具花药的5个花丝束互生；子房着生在雌雄蕊柄的顶端，5室，5裂，每室有胚珠4个，花柱纤



1—5. 银叶树 *Heritiera littoralis* Dryand.: 1.花枝, 2.花, 3.花切面示雄蕊, 4.雄蕊放大, 5.果枝。
 6—10. 蝴蝶树 *Heritiera parvifolia* Merr.: 6.花枝, 7.花, 8.雄蕊, 9.雌蕊, 10.果。11—14. 长柄银叶树 *Heritiera angustata* Pierre: 11.花枝, 12.花, 13.雄蕊, 14.果。(黄少容绘)