

宽几达 1.5 毫米;雌雄蕊柄长约 10 毫米,无毛,子房有短柔毛。蒴果椭圆状梨形,长 1.5—2 厘米,宽 1—1.5 厘米,顶端截形,密被淡黄褐色短柔毛;种子连翅长 1.6 厘米,翅膜质,矩圆状镰刀形或矩圆状椭圆形,顶端钝。花期 5—7 月。

产福建将乐、三明和江西石城。生于海拔 280 米的村边杂木林中和林缘。

7. **两广梭罗**(中国树木分类学) 复序利未花(中国植物图谱),油在麻(惠阳莲花山土名) 图版 41: 1—6

Reevesia thyrsoidea Lindley in Quart. Journ. Sci. Lit. Arts. 2 (2): 112. 1827; Benth. Fl. Hongk. 37. 1861; Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 91. 1886; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 486—487. fig. 46. 1911; Dunn & Tutcher in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 49. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5 (1—2): 127. 1927; Hu, Wang & Hsia in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Ser. 8: 341. 1938; Tardieu-Blot in Humbert Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 414. 1945; 陈焕镛等,海南植物志 2: 79. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 827. 图 3383. 1972.

常绿乔木,树皮灰褐色;幼枝干时棕黑色,略被稀疏的星状短柔毛。叶革质,矩圆形、椭圆形或矩圆状椭圆形,长 5—7 厘米,宽 2.5—3 厘米,顶端急尖或渐尖,基部圆形或钝,两面均无毛;叶柄长 1—3 厘米,两端膨大。聚伞状伞房花序顶生,被毛,花密集;萼钟状,长约 6 毫米,5 裂,外面被星状短柔毛,内面只在裂片的上端被毛,裂片长约 2 毫米,顶端急尖;花瓣 5 片,白色,匙形,长 1 厘米,略向外扩展;雌雄蕊柄长约 2 厘米,顶端约有花药 15 个;子房圆球形,5 室,被毛。蒴果矩圆状梨形,有 5 棱,长约 3 厘米,被短柔毛;种子连翅长约 2 厘米。花期 3—4 月。

产广东中部、东部、南部和海南岛,广西南部(上林、十万大山)和云南南部。生于海拔 500—1500 米的山坡上或山谷溪旁。越南和柬埔寨也有分布。

8. **长柄梭罗**(海南植物志) 硬壳果树(海南临高) 海南梭罗树(中国树木分类学)

Reevesia longipetiolata Merr. & Chun in Sunyatsenia 2: 40. 1934; 陈焕镛等,海南植物志 2: 78—79. 图 330. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 827. 图 3384. 1972.

乔木,高 8—25 米;树皮灰褐色;小枝的幼嫩部分略被毛,干时紫黑色。叶矩圆形或矩圆状卵形,长 7—15 厘米,宽 3—6 厘米,顶端钝或急尖,基部急尖,两面均光亮无毛;侧脉每边 8—12 条;叶柄长 1.5—3.5 厘米,两端膨大,无毛。聚伞状伞房花序顶生,长约 10 厘米,密被星状短柔毛;花梗长约 7 毫米;萼倒卵状钟形,长 8—9 厘米,3—5 裂,外面被星状短柔毛,裂片矩圆状卵形,长 1.5 毫米;花瓣 5 片,白色,倒披针形,具爪,长 2 厘米,宽约 4 毫米,无毛;雌雄蕊柄长 2—2.5 厘米,无毛。蒴果矩圆状梨形,长 4—4.5 厘米,宽 2.5 厘米,有 5 棱,略被短茸毛;种子具翅,连翅长约 2.5 厘米。花期 3—4 月。

产海南岛(临高、定安、陵水、昌江)。生于山上密林中。



1—6. 两广梭罗 *Reevesia thyrsoidea* Lindl.: 1. 花枝, 2. 花的纵切面, 3. 花瓣, 4. 开裂的果, 5. 果瓣, 6. 种子。7—8. 罗浮梭罗 *Reevesia lofouensis* Chun & Hsue: 7. 果枝, 8. 种子。(邓晶发、赖玉珍绘)