

宽几达 1.5 毫米;雌雄蕊柄长约 10 毫米,无毛,子房有短柔毛。蒴果椭圆状梨形,长 1.5—2 厘米,宽 1—1.5 厘米,顶端截形,密被淡黄褐色短柔毛;种子连翅长 1.6 厘米,翅膜质,矩圆状镰刀形或矩圆状椭圆形,顶端钝。花期 5—7 月。

产福建将乐、三明和江西石城。生于海拔 280 米的村边杂木林中和林缘。

7. **两广梭罗**(中国树木分类学) 复序利未花(中国植物图谱),油在麻(惠阳莲花山土名) 图版 41: 1—6

Reevesia thyrsoidea Lindley in Quart. Journ. Sci. Lit. Arts. 2 (2): 112. 1827; Benth. Fl. Hongk. 37. 1861; Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 91. 1886; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 486—487. fig. 46. 1911; Dunn & Tutcher in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 49. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5 (1—2): 127. 1927; Hu, Wang & Hsia in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Ser. 8: 341. 1938; Tardieu-Blot in Humbert Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 414. 1945; 陈焕镛等,海南植物志 2: 79. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 827. 图 3383. 1972.

常绿乔木,树皮灰褐色;幼枝干时棕黑色,略被稀疏的星状短柔毛。叶革质,矩圆形、椭圆形或矩圆状椭圆形,长 5—7 厘米,宽 2.5—3 厘米,顶端急尖或渐尖,基部圆形或钝,两面均无毛;叶柄长 1—3 厘米,两端膨大。聚伞状伞房花序顶生,被毛,花密集;萼钟状,长约 6 毫米,5 裂,外面被星状短柔毛,内面只在裂片的上端被毛,裂片长约 2 毫米,顶端急尖;花瓣 5 片,白色,匙形,长 1 厘米,略向外扩展;雌雄蕊柄长约 2 厘米,顶端约有花药 15 个;子房圆球形,5 室,被毛。蒴果矩圆状梨形,有 5 棱,长约 3 厘米,被短柔毛;种子连翅长约 2 厘米。花期 3—4 月。

产广东中部、东部、南部和海南岛,广西南部(上林、十万大山)和云南南部。生于海拔 500—1500 米的山坡上或山谷溪旁。越南和柬埔寨也有分布。

8. **长柄梭罗**(海南植物志) 硬壳果树(海南临高) 海南梭罗树(中国树木分类学)

Reevesia longipetiolata Merr. & Chun in Sunyatsenia 2: 40. 1934; 陈焕镛等,海南植物志 2: 78—79. 图 330. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 827. 图 3384. 1972.

乔木,高 8—25 米;树皮灰褐色;小枝的幼嫩部分略被毛,干时紫黑色。叶矩圆形或矩圆状卵形,长 7—15 厘米,宽 3—6 厘米,顶端钝或急尖,基部急尖,两面均光亮无毛;侧脉每边 8—12 条;叶柄长 1.5—3.5 厘米,两端膨大,无毛。聚伞状伞房花序顶生,长约 10 厘米,密被星状短柔毛;花梗长约 7 毫米;萼倒卵状钟形,长 8—9 厘米,3—5 裂,外面被星状短柔毛,裂片矩圆状卵形,长 1.5 毫米;花瓣 5 片,白色,倒披针形,具爪,长 2 厘米,宽约 4 毫米,无毛;雌雄蕊柄长 2—2.5 厘米,无毛。蒴果矩圆状梨形,长 4—4.5 厘米,宽 2.5 厘米,有 5 棱,略被短茸毛;种子具翅,连翅长约 2.5 厘米。花期 3—4 月。

产海南岛(临高、定安、陵水、昌江)。生于山上密林中。

本种与两广梭罗很相似,但本种的叶较大,有侧脉8—12对;花较大,萼长8—9毫米,可以区别。

9. 圆叶梭罗 (植物分类学报)

Reevesia orbicularifolia Hsue in *Acta Phytotax.* 15 (1): 81—82. 1977.

乔木,高10米,胸高直径30厘米;树皮灰褐色;小枝无毛或在幼嫩部分略被稀疏的浅褐色或灰白色星状短柔毛。叶革质,圆形或卵圆形,长7—18厘米,宽6—16厘米,顶端圆形或有钝的突尖,基部圆形或截形,上面被稀疏的星状短柔毛,后脱净,下面密被淡黄褐色星状短柔毛,基生脉5条,叶脉在上面凹陷,在下面凸出;叶柄长3.5—7厘米,无毛或略被毛。蒴果椭圆状梨形,生时棕褐色,干时暗褐色,长2.5厘米,宽1.5—2厘米,具5棱,被稀疏的淡黄褐色星状短柔毛及鳞秕;种子连翅长2.2厘米,翅膜质,矩圆形,褐色,顶端钝,略成镰刀形弯曲。 果期12月。

产云南西畴。生于海拔1500米的较干燥的石灰岩山地次生林中。

本种的叶圆形,稀为卵圆形,长宽几相等,小枝和叶柄无毛或略被毛,易于识别。

10. 粗齿梭罗 (植物分类学报) 岭南梭罗树 (中国树木分类学) 图版42: 1—3

Reevesia rotundifolia Chun in *Sunyatsenia* 1: 269. 1934; 陈嵘, 中国树木分类学 798. 1937.

乔木,高16米;树皮灰白色;幼枝密被淡黄褐色星状短柔毛。叶薄革质,圆形或倒卵状圆形,直径6—11.5厘米,或宽略过于长,顶端圆形或截形而有凸尖,基部截形或圆形,在顶端的两侧有粗齿2—3个,上面沿主脉和侧脉被淡黄褐色短柔毛,下面密被淡黄褐色短柔毛,侧脉5—6对;叶柄长4—4.5厘米,被毛。蒴果倒卵状矩圆形,有5棱,长3—4厘米,顶端圆形,被淡黄色短柔毛和灰白色鳞秕;种子连翅长约2.5厘米,翅膜质,褐色,顶端斜钝形。

产广西南部十万大山。生于海拔1000米的山上。本种只见于十万大山,叶缘的两侧各有粗齿2—3个,易于识别。

11. 瑶山梭罗 (植物分类学报) 九层皮 (广西阳朔)

Reevesia glaucophylla Hsue in *Acta Phytotax. Sinica* 8 (3): 272—273. 1963.

乔木,高8—16米;树皮灰色或灰褐色,有纵裂纹,嫩枝几无毛。叶纸质或薄革质,椭圆形、矩圆形或矩圆状卵形,长8—13.5厘米,宽4—7厘米,顶端急尖,基部钝、圆形或浅心形,上面沿主脉和侧脉被淡黄褐色星状短柔毛,下面密被灰白色星状短柔毛和通常有白霜;叶柄长2—5厘米,有毛。聚伞状伞房花序顶生,长4—6厘米,被淡黄褐色星状短柔毛;花梗纤细,长约4毫米;花很小,萼长3毫米,外面密被淡黄褐色星状短柔毛,5裂,裂片三角形,长约1毫米;花瓣5片,矩圆状倒披针形,长约4毫米,顶端钝,在中部以下收窄成纤细的爪;雌雄蕊柄纤细,长约8毫米;子房圆球形,有5纵沟,被毛,花柱很短,柱头不