

果实除作水果利用之外,虫瘿可入药,治疝气及腰痛;从果实提取新药 Polygamol 为强心利尿的注射药。

8. 对萼猕猴桃(拉汉种子植物名称)

Actinidia valvata Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 404. 1911; Li in Journ. Arn. Arb. 33: 23—24. 1952.

中型落叶藤本;着花小枝淡绿色,长10—15厘米,直径约2毫米,幼嫩时薄被极微小的茸毛,皮孔很不显著;隔年枝灰绿色,皮孔较显著;髓白色,实心。叶近膜质,阔卵形至长卵形,长5—13厘米,宽2.5—7.5厘米,顶端渐尖至浑圆形,基部阔楔形至截圆形,不下延或下延,两侧稍不对称;边缘有细锯齿,腹面绿色,背面稍淡,两面均无毛,叶脉不很发达,侧脉5—6对;叶柄水红色,无毛,长15—20毫米。花序2—3花或1花单生;花序柄长约1.5厘米,花柄不及1厘米,均略被微茸毛;苞片钻形,长1—2毫米;花白色,径约2厘米;萼片2—3片,卵形至长方卵形,长6—9毫米,两面均无毛或外面的中间部分略被微茸毛;花瓣7—9片,长方倒卵形,长1—1.5厘米,宽10—12毫米;花丝丝状,长约5毫米,花药橙黄色,条状矩圆形,长2.5—4毫米;子房瓶状,长约5毫米,洁净无毛,花柱比子房稍长。果成熟时橙黄色,卵珠状,稍偏肿,长2—2.5厘米,无斑点,顶端有尖喙,基部有反折的宿存萼片;种子长1.75—3.5毫米。

主产华东,延及湖南、湖北。分2变种。

8a. 对萼猕猴桃(原变种) 图版61: 1—3

Actinidia valvata Dunn var. *valvata*

叶卵形至长方卵形,顶端短渐尖至渐尖,基部截圆形至阔楔形;花瓣近圆形;种子长3—3.5毫米。花期5月上旬。

产安徽、浙江、江西、湖北、湖南等省。生于低山区山谷丛林中。模式标本采自江西庐山。

8b. 麻叶猕猴桃 图版61: 4—6

Actinidia valvata Dunn var. *boehmeriaefolia* C. F. Liang in Addenda.

叶阔卵形,比原变种大,长9—13厘米,宽5.5—7.5厘米,锯齿粗大。

产江西、浙江。生于海拔1100米左右山地疏林中。模式标本采自江西庐山。

9. 大籽猕猴桃

Actinidia macrosperma C. F. Liang in Addenda.

中小型落叶藤本或灌木状藤本;着花小枝淡绿色,长5—20厘米,一般12厘米,直径2—2.5毫米,无毛或下部薄被锈褐色小腺毛,皮孔不显著或稍显著,叶腋上偶见花柄萎断后残存的刺状遗体;芽无毛;隔年枝绿褐色,皮孔小且稀,仅仅可见;髓白色,实心。叶幼时膜质,老时近革质,卵形或椭圆形,长3—8厘米,宽1.7—5厘米,顶端渐尖、急尖至浑圆形,基部阔楔形至圆形,两侧对称或稍不对称,边缘有斜锯齿或圆锯齿,老时或近全缘,腹