

和内面薄被黄灰白色短茸毛；花瓣 5 枚，倒卵形，长 8—9 毫米；花丝丝状，长 2.5—3.5 毫米，花药黄色，卵形，长约 1 毫米；子房柱状近球形，长约 3 毫米，薄被黄灰色短茸毛，花柱比子房稍长。果暗绿色，秃净，具黄褐色斑点，柱状长圆形，长 15 毫米以上，直径 8 毫米左右；种子长 1—1.5 毫米。花期 5 月上旬—6 月上旬。

产贵州东北部的江口县和印江县。生于海拔 850—1980 米山地上的灌丛中或疏林中。模式标本采自江口县。

20. 华南猕猴桃

Actinidia glaucophylla F. Chun in Sunyatsenia 7: 14. 1948.——*Actinidia longicauda* F. Chun in Sunyatsenia 7: 14. 1948.——*Actinidia fortunatii* auct. non Fin. & Gagn.; Li in Journ. Arn. Arb. 33: 37. 1952.

小型落叶或半落叶藤本，全体无毛或仅子房多少被毛；小枝干后黑褐色或黄灰色，直径 2—3 毫米，隔年枝稍粗；髓白色，片层状。叶卵形、卵状披针形至披针形或长方椭圆形，等侧或不等侧，直伸或弯歪，长 7—12 厘米，宽 3—5 厘米，顶端渐尖或短尖，基部钝形、狭浅心形至耳形，边缘锯齿大多细小，腹面绿色，无毛或个别变种有少量糙伏毛，背面被白粉或苍绿色，完全无毛，叶脉不发达，侧脉 6—7 对；叶柄长 1.2—2.5 厘米。花序一般有花 3 朵，花序柄长 2—10 毫米，花柄长 3—5 毫米；苞片钻形，长 2—4 毫米；花淡红色，直径 8—10 毫米；萼片 5 片，长 3—5 毫米；花瓣 5 片，倒卵形，长 4—6 毫米；花药黄色，大致与花丝等长，1.5—2 毫米；子房圆柱形，长 2.5—3 毫米，洁净无毛或仅顶部略被柔毛或全体被毛。果灰绿色，圆柱形，或卵状圆柱形，长 15—18 毫米；种子小，长约 1 毫米。花期 4 月中—5 月底，果期 11 月。

产南岭和广东、广西各地。分为 3 变种。

20a. 华南猕猴桃 (原变种) 图版 65: 3—4

Actinidia glaucophylla F. Chun var. *glaucophylla*

叶披针形或长方椭圆形，大多两侧相等，不歪斜，基部钝形至浅心形，两面完全无毛，背面粉绿色。花序和花较短较小；花序柄长 2—4 毫米，花柄长 3—4 毫米；花径 8 毫米；子房完全无毛或顶部略被柔毛。

产广东、广西和湖南，主要是南岭地区。1000 米以下的低山和丘陵上的乔木林中、灌丛中，谷地或坡地等处都常见生长。模式标本采自广东乳源。

20b. 耳叶猕猴桃 (拉汉种子植物名称) (新组合) 图版 65: 5—6

Actinidia glaucophylla F. Chun var. *asymmetrica* (F. Chun) C. F. Liang comb. nov.——*Actinidia asymmetrica* F. Chun in Sunyatsenia 7: 13. 1948; Li in Journ. Arn. Arb. 33: 39—40. 1952.

叶卵形至卵状披针形，多不等侧且弯歪，基部耳形，两面完全无毛，背面被白粉，粉易脱落。花序柄长 4—10 毫米，花柄长 4—5 毫米；苞片 3—4 毫米；花直径 10 毫米；子房完