

37b. 密花猕猴桃

Actinidia rufotricha C. Y. Wu var. *glomerata* C. F. Liang in Addenda.
 — *Actinidia fulvicoma* var. *fulvicoma* auct. non Hance; Li in Journ. Arn.
 Arb. 33: 57. 1952, quoad R. C. Ching 7177.

叶背被棉絮状毛被,易于块状脱落;因毛被很厚,星状毛不易观察。

产广西北部部的凌云、乐业和贵州西南角的安龙。模式标本采自此两地。

38. 黄毛猕猴桃(拉汉种子植物名称)

Actinidia fulvicoma Hance in Journ. Bot. 23: 321. 1885; Dunn in Journ.
 Linn. Soc. Bot. 39: 409. 1911, quoad Ford 109, excl. specim. Guizhou.

中型半常绿藤本;着花小枝一般长10—15厘米,径约3毫米,密被黄褐色绵毛或锈色长硬毛,有稀疏细小皮孔,隔年枝灰褐色,直径3—5毫米或稍大,一般多少有毛被残迹,皮孔小且疏,很不显著;髓白色,片层状。叶纸质至亚革质,卵形、阔卵形、长卵形至披针形长卵形、或卵状长圆形,长8—18厘米,宽4.5—10厘米,顶端渐尖至短尖或钝,基部通常浅心形,偶见钝形,边缘具睫毛状小齿,腹面绿色,密被糙伏毛或蛛丝状长柔毛,或被短糙伏毛而毛易断损成颗粒状,或仅中脉和侧脉被或长或短的糙伏毛,背面淡绿色,密被或深或浅的黄褐色星状绒毛,大小叶脉上的毛颜色较深,因此从中脉至网状小脉都十分显著易见,侧脉9—10对;叶柄较粗厚,长1—3厘米,密被黄褐色绵毛或锈色长硬毛。聚伞花序密被黄褐色绵毛,通常3花;花序柄4—10毫米,花柄7—20毫米;苞片钻形,长2—6毫米;花白色,半开展,径约17毫米;萼片5片,卵形至长方长卵形,长4—9毫米,外面被绵毛,内面无毛或中部薄被绒毛;花瓣5片,无毛,倒卵形至倒长卵形,长6—17毫米;花丝长3—7毫米,花药黄色,卵状箭头形,长1—1.2毫米;子房球形,径约3.5毫米,密被黄褐色绒毛,花柱斜举,长约4毫米。果卵珠形至卵状圆柱形,幼时被绒毛,成熟后秃净,暗绿色,长约1.5—2厘米,具斑点,宿存萼片反折;种子纵径1毫米强。花期5月中旬—6月下旬,果熟期11月中旬。

38a. 黄毛猕猴桃(原变种) 图版71: 1

Actinidia fulvicoma Hance var. *fulvicoma*

叶亚革质,卵状长圆形或卵状披针形,长9—18厘米,宽4.5—6厘米,腹面遍被短糙毛或硬伏毛,毛易断损成硬头突起始,手摩感觉粗涩,中脉和侧脉被长糙毛。

产广东中部至北部和湖南及江西的南部。生于海拔130—400米山地疏林中或灌丛中。模式标本采自广东罗浮山。

本种一共分为3变种和3变型。

38b. 厚叶猕猴桃 图版71: 6

Actinidia fulvicoma Hance var. *pachyphylla* (Dunn) Li in Journ. Arn.
 Arb. 33: 57—58. 1952, quoad nom. tantum.— *Actinidia pachyphylla* Dunn in