

色,直径13毫米左右;萼片2—3片,卵形或近圆形,长约5毫米,两面均被茶褐色茸毛;花瓣5片,长圆形或长方倒卵形,长6—8毫米;花丝丝状,长4—5毫米,花药长圆形,长1.2—1.5毫米;雌性花子房未见,雄花退化子房颗粒状,被茶褐色茸毛。果未见。花期5月中旬。

产湖南和福建。模式标本采自湖南芷江。

本种最接近小叶猕猴桃 *A. lanceolata*, 其不同点是髓白色;叶较阔大,叶脉较为发达显著,各部分的毛较长,毛被较为蓬松,色泽较浅,为茶褐色,叶背的星状毛在一般(10倍)放大镜下清楚可见(后者则是极难观察的)。

#### 43. 小叶猕猴桃 (中国高等植物图鉴) 图版 72: 2

*Actinidia lanceolata* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 356. 1908; 39: 408. 1911; Li in Journ. Arn. Arb. 33: 58—59. 1952; Icon. Corm. Sin. 2: 839, fig. 3408. 1972.


小型落叶藤本;着花小枝一般长10—15厘米,距状枝5—7厘米,径约2毫米,密被锈褐色短茸毛,皮孔可见;隔年枝灰褐色,秃净无毛,皮孔小,不很显著;髓褐色,片层状。叶纸质,卵状椭圆形至椭圆披针形,长4—7厘米,宽2—3厘米,顶端短尖至渐尖,基部钝形至楔尖,边缘的上半部有小锯齿,腹面绿色,散被粉末状微毛或完全无毛,背面粉绿色,密被短小且密致的灰白色星状茸毛,星状毛在一般放大镜下不易观察,侧脉5—6对,横脉和网状小脉肉眼不易观察;叶柄长8—20毫米,密被锈褐色茸毛。聚伞花序2回分歧,有花7朵或少于7朵,密被锈褐色茸毛,花序柄长3—6毫米,花柄长2—4毫米;苞片钻形,长1—1.5毫米;花淡绿色,直径约1厘米;萼片3—4片,卵形或长圆形,长约3毫米,3枚的萼片中1或2枚的顶端有楔状浅裂,内外面均被茸毛,内面的毛被较薄;花瓣5片,条状长圆形或瓢状倒卵形,长4—5.5毫米,雄花的稍较长;花丝1—4毫米,花药长圆形,长1—1.5毫米,雄花的均稍较长;子房球形或卵形,径约1.5毫米,密被茸毛,花柱下部1/3或基部小部分粘连,粘连部分有毛或无毛,不育子房卵形,被毛。果小,绿色,卵形,长8—10毫米,秃净,有显著的浅褐色斑点,宿存萼片反折;种子纵径1.5—1.8毫米。花期5月中—6月中。果熟期11月。

产浙江、江西、福建、湖南、广东等省。生于海拔200—800米山地上的高草灌丛中或疏林中和林缘等环境。模式标本采自福建南平。

本种与安息香猕猴桃 *A. styracifolia* 最近缘,其次与阔叶猕猴桃 *A. latifolia* 亦较近。其区别特征是叶小,果小,叶背的星状毛非常短小密致。

44. 毛花猕猴桃 (拉汉种子植物名称) 毛冬瓜 (浙江、江西、广西),毛花杨桃(中国高等植物图鉴),白藤梨

*Actinidia eriantha* Benth. in Journ. Linn. Soc. Bot. 5: 55. 1861; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 408. 1911; Chun in Sunyatsenia 1: 271, pt. 37. 1934; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18: 222. 1937; Li in Journ. Arn. Arb. 33: 52.



1. 阔叶猕猴桃 *Actinidia latifolia* (Gardn. & Champ.) Merr. var. *latifolia*: 果枝。2. 小叶猕猴桃 *Actinidia lanceolata* Dunn: 果枝。3. 安息香猕猴桃 *Actinidia styracifolia* C. F. Liang: 花枝。  
(何顺清绘)