

毛或仅花柄及分枝有极少小柔毛,花序柄长 1.5—3 厘米,花柄长 4—6 毫米;小苞片狭披针形,长 3—5 毫米;花粉红色;萼片无毛,卵状矩圆形,长约 4 毫米;花瓣矩圆形,长约 6 毫米;花药卵形,长约 2.5 毫米,顶端锐尖,花丝粗短,比花药稍长;子房球形,无毛,径约 2.5 毫米,花柱长约 5 毫米,顶部弯曲。果未见。花期 6 月上旬。

四川特有,产平武。生于海拔 1860 米山林中。

本种无毛的特征和枝、叶外形相像猕猴桃藤山柳和杨叶藤山柳。它有别于两者的明显特征是叶干燥后银灰色,其次是花 3—7 朵,比第一种 (1 花) 和第二种 (3 花) 都多。

3. 平武藤山柳 (东北林学院植物研究室汇刊) 图版 76: 11—15

Clematoclethra pingwuensis C. Y. Chang et Y. C. Chen in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 8: 88. 1980.

小枝无毛,幼时紫绿色。叶近革质,狭卵形,长 4—5.5 厘米,宽 1.4—2.5 厘米,顶端渐尖,基部近圆形,边缘具稀疏细锯齿,常反卷,腹面无毛,背面黄绿色,全面被短柔毛;叶柄带红色,无毛,长 1—2 厘米。花序柄无毛,长约 1 厘米,有花 3—7 朵;花柄无毛,长 4 毫米,基部具披针形小苞片 2 枚;萼片 5,紫绿色,卵形或阔卵形,长 3—4 毫米,无毛或上部略被微柔毛,边缘具缘毛;花瓣 5,白色,近圆形,长约 5 毫米。果未见。花期 6 月。

四川特有,产北部平武。生于海拔 1800 米山林中。模式标本采自此地。

本种最特异之点是小枝、花序和萼片等部分均无毛而叶背却全面被柔毛。

4. 藤山柳 (中国高等植物图鉴)

Clematoclethra lasioclada Maxim. in Act. Hort. Petrop. 11: 38. 1890; Kom. in Act. Hort. Petrop. 29: 95. 1908; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 386. 1915; Journ. Arn. Arb. 9: 95. 1928.

老枝黑褐色,无毛;小枝被淡褐色绒毛,易秃净,果期在基部尚可见到残存绒毛。叶纸质,厚薄不定,卵形、倒卵形、椭圆形或矩圆形,长 5—13 厘米,宽 3—8 厘米,生长在岩山上的植株叶片缩小,仅长 4.5—5.5 厘米,宽 3—4 厘米,徒长枝上的叶较大,长可达 10 厘米,宽 6 厘米,顶端急尖或渐尖,基部圆形或微心形,徒长枝上的叶为阔卵形,基部心形,腹面绿色,除沿叶脉有绒毛外,余处无毛,背面沿叶脉有绒毛,边缘有纤毛状锯齿;叶柄长 2.5—7 厘米,初被绒毛,后变秃净,干后稍扁平。花序柄长 1.5 厘米,被绒毛,通常有花 3 朵,稀达 5 朵;小苞片披针形,有绒毛,花白色;萼片倒卵形,长 3 毫米,被绒毛;花瓣卵形,长 6 毫米。果球形,干后径 5 毫米。

分为 2 变种。

4a. 藤山柳 (原变种)

Clematoclethra lasioclada Maxim. var. **lasioclada**

叶长 5—9 厘米,宽 3—5 厘米。花序一般着花 3 朵。花期 6 月,果期 8 月。

产陕西、甘肃、四川。生于海拔 1500—3000 米的山地沟谷林中或林缘。模式标本采