

自甘肃。

4b. 大叶藤山柳 (新拟)

Clematoclethra lasioclada Maxim. var. **grandis** (Hemsl.) Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 386. 1915.——*Clematoclethra grandis* Hemsl. in Hook. Icon. 29, in textu ad t. 2808. 1906; Kom. in Act. Hort. Petrop. 29: 95. 1908.——*Clematoclethra pratii* Kom. in Act. Hort. Petrop. 29: 95. 1908.

叶阔卵形,长10—13厘米,宽6—8厘米,顶端渐尖,基部近圆形或微凹;叶柄长3—8厘米。花序柄长1.5—2.5厘米,有花3—5朵。花期6月,果期8月。

四川特有,产西部天全、雅安等地。生于海拔2000—3000米山地沟谷林缘或林中。模式标本采自康定县。

5. 繁花藤山柳 (新拟)

Clematoclethra hemsleyi Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris 2: 873. 1890; Hemsl. in Hook. Icon. 29, t. 2808. 1906.——*Clematoclethra tomentella* Franch. in Journ. de Bot. 8: 280. 1894.

粗壮藤本,枝条直立;小枝被绒毛,很快秃净。叶卵形或椭圆形,长5—10厘米,宽3—5厘米,顶端短渐尖,基部圆形,边缘具疏隔的纤毛状锯齿,腹面深绿色,除中脉具微柔毛外,余处无毛,背面浅绿色,沿中脉和侧脉被淡红色长柔毛,有时秃净,脉腋上有髯毛;叶柄细长,近无毛,长4—8厘米。花序柄密被淡红色长柔毛,有花6—12朵,在果期长达20—30毫米;小苞片披针形,被长柔毛,花柄在果期长达7—11毫米。花白色,萼片椭圆形,密被淡红色柔毛,长4毫米,宽3毫米。果球形,干后径6毫米。花期6—7月,果期7—8月。

产四川和湖北。生于海拔1500—1800米的山地密林中。模式标本采自湖北房县。

6. 变异藤山柳 (新种)

Clematoclethra variabilis C. F. Liang et Y. C. Chen in Addenda.

小枝薄被黄褐色绒毛或兼被或多或少的刚毛,后来渐变秃净。叶长卵形、椭圆形或披针形,侧生短花枝(长3—5厘米)叶长4—6厘米,宽1.8—2.4厘米,顶生长花枝(长9厘米以上),叶长8—12厘米,宽4—5厘米;顶端渐尖,基部圆形、钝形或楔形,边缘具纤毛状小齿,侧脉8—12对,腹面完全无毛或偶见叶脉上有少量短小刚毛,背面粉绿色,完全无毛或叶脉上薄被少量细绒毛或脉腋上偶见髯毛,极少见中脉上有刚毛;叶柄水红色,无毛或极稀薄细绒毛,长2—3(短枝上的)或4—7(长枝上的)厘米。花序1—3花,壮枝或可得7花,被细绒毛,总柄长1—2.5厘米,花柄长2—8毫米;小苞片披针形,长3—4毫米,近无毛,花白色,直径7—10毫米;萼片红绿色,长圆形,长4—5毫米,基本无毛,至多边缘略具纤毛;花瓣长约7毫米。果淡绿色,直径8—10毫米,宿存花柱长4—6毫米。

分为2变种。