

6a. 变异藤山柳 (原变种)

Clematoclethra variabilis C. F. Liang et Y. C. Chen var. **variabilis** 图版 77: 1

小枝初被绒毛, 后变秃净, 有时出现少量刚毛。叶长卵形或长圆形至卵状或矩状披针形, 基部浑圆, 侧脉 8—9 对, 背面叶脉被细绒毛。花径和果径均 10 毫米左右。花期 6 月, 果期 7—8 月。

四川特有, 产南川、普格和峨眉山等地。生于海拔 1500—2500 米山林中。模式标本采自南川金佛山凤凰寺至铁瓦寺途中。

6b. 多脉藤山柳 (新变种)

Clematoclethra variabilis C. F. Liang et Y. C. Chen var. **multinervis** C. F. Liang et Y. C. Chen in Addenda.

小枝被绒毛和刚毛, 有时仅被绒毛。叶椭圆形, 顶端渐尖, 基部楔形或钝形, 侧脉 11—15 对, 背面仅叶脉略被细绒毛或全面薄被短柔毛。花径 7—8 毫米。果径 8 毫米左右。花期 6 月, 果期 8 月。

四川特有, 产南川, 生于海拔 1650—1850 米的山林中。模式标本采自南川狮子口。

7. 多花藤山柳 (新种) 图版 77: 2—3

Clematoclethra floribunda W. T. Wang in Addenda.

小枝灰黑色, 有棱, 被绒毛。叶革质, 披针形, 长 3—5 厘米, 宽 1—2 厘米, 顶端渐尖, 基部圆形, 叶缘有疏隔的纤毛状锯齿, 但由于叶缘反卷, 故极像全缘, 腹面无毛, 背面除脉腋有不显著髯毛外, 全洁净; 叶柄短, 长 1—2 厘米, 无毛。花序柄长 2—2.5 厘米, 密被绒毛, 有 5—7 花; 小苞片披针形, 无毛; 花柄毛被较厚, 毛较长。萼片矩圆形或卵形, 长 4 毫米, 无毛。果扁球形, 干后径 5—6 毫米。花期 6 月, 果期 8 月。

四川特有, 产茂汶县。生于海拔 2100 米的山地密林中。模式标本采自此处。

本种近变异藤山柳 *C. variabilis* var. *variabilis*, 但本种叶片小, 花序花较多。

8. 圆叶藤山柳 (新拟)

Clematoclethra franchetii Kom. in Act. Hort. Petrop. 29: 94. 1908; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 388. 1915.

老枝黑褐色, 无毛; 小枝被绒毛。叶卵形至阔卵形, 长 8—12 厘米, 宽 4.5—8 厘米, 顶端急尖至短渐尖, 基部心形或近圆形, 或截平形而稍凹, 边缘具纤毛状小齿, 腹面沿中脉有柔毛或兼散生软刺毛, 余处无毛, 背面普遍被绒毛, 沿叶脉特厚; 叶柄长 2—6 厘米, 密被绒毛, 干后扁平, 宽达 2 毫米。花序柄长 1.5—2 厘米, 被绒毛, 通常有 3 花; 花柄长约 1 厘米, 密被绒毛; 花白色; 萼片倒卵形, 长 4 毫米, 密被绒毛; 花瓣倒卵形, 长约 8 毫米。果球形, 干后径达 8 毫米。花期 6 月, 果期 8 月。

产四川峨眉山、峨边、雷波和湖北巴东神农架等地。生于海拔 2000—2500 米的山林



1. 变异藤山柳 *Clematoclethra variabilis* C. F. Liang et Y. C. Chen var. *variabilis*. 2—3. 多花藤山柳 *Clematoclethra floribunda* W. T. Wang: 2. 果枝, 3. 叶背部分放大, 示反卷的叶缘。(何顺清绘)

diam., sepalis oblongis 4—5 mm longis glabris margine leviter ciliatis exceptis, petalis circ. 7 mm longis. Fructus pallide viridis 10 mm in diam. stylo persistenti 4—6 mm longo.

Sichuan: Nanchuan-xian (南川县); He Xian-yu (贺贤育) 4805 (Typus! IN); Qu Gui-ling (曲桂龄) 1239 (IB); Li Guo-feng (李国凤) 62699 (IB), 63304 (IB). Puge-xian (普格县), Sichuan Econ. Pl. Exp. (四川经济植物采集队) 5497 (IB).

6b. *Clematoclethra variabilis* C. F. Liang et Y. C. Chen var. **multinervis** C. F. Liang et Y. C. Chen, var. nov.

A var. *variabilis* recedit foliis basibus cuneatis vel obtusis, nervis lateralibus pluribus (11—15-jugis), floribus minoribus (7—8 mm in diam.), fructu minori (circ. 8 mm in diam.).

Sichuan: Nanchuan-xian (南川县); alt. 1,800 mm, Li Guo-feng (李国凤) 61992 (Typus! IB); alt. 1,650—1,850 m, Xiong Ji-hua & Zhou Zi-lin (熊济华、周子林) 92584 (IB, IG), 92774 (IB).

7. *Clematoclethra floribunda* W. T. Wang, sp. nov. Pl. 77, t. 2—3

C. variabilis C. F. Liang et Y. C. Chen var. *variabilis* similis sed foliis minoribus (7×2.2 cm maximis), cymis floribundis (5—7-floris) differt.

Ramuli atro-grisei angulati tomentosi. Folia coriacea lanceolata 3—7 cm longa et 1—2.2 cm lata, apice acuminata, basi rotundata, margine revoluta remote ciliato-serrulata, supra glabra; subtus in axillas venarum inconspicue barbellata excepta glabra; petioli brevi 1—2 cm longi glabri. Pedunculi 2—2.5 cm longi dense tomentosi 5—7-flori bracteolis lanceolatis glabris; pedicelli longiore et confertim tomentosi. Sepala oblonga vel ovata 4 mm longa glabra. Bacca compresse globosa in sicco 5—6 mm diametro.

Sichuan: Nanchuan (南川), alt. 1,800 m, Li Guo-feng (李国凤) 61992 (Typus! IB).

12. *Clematoclethra guangxiensis* C. F. Liang et Y. C. Chen, sp. nov. Pl. 78, t. 1—6

C. scandenti Maxim. similis indumento et folii forma sed ramulis petiolis foliis subtus costique praecipue tomentosis, minus setosis, floribus minoribus differt.

Rami annotini atro-brunnei glabri; ramuli brunnei, dense tomentosi et paucae setosi. Folia ovata 3—8 cm longa et 3—4.5 cm lata, apice acuminata, basi subrotundata, margine crenato-serrata leviter revoluta, supra virides se-