

中。模式标本采自四川西部。

9. 二列藤山柳 (新拟)

Clematoclethra disticha Hemsl. in Hook. Icon. 29, sub t. 2808. 1906.

枝条直立;小枝被亮褐色绒毛。叶纸质,厚,二列状排列,椭圆形至椭圆披针形,长7—15厘米,宽4—6厘米,顶端短尖至长渐尖,基部阔楔形,边缘稍反卷,具疏隔的胼胝质睫毛状小齿,背面密被淡红色绒毛,腹面除中脉具微柔毛外,余处无毛,叶面的叶脉凸起,网眼明显;叶柄长1—3厘米,被绒毛。花序柄长1—2厘米,与叶柄等长或短于叶柄,被绒毛,有花3朵;花柄长约5毫米;小苞片披针形,外面被绒毛;花白色;萼片矩圆形,长3毫米,果期亦密被绒毛;花瓣长5毫米。花期6月,果期8月。

四川特有,产峨眉山。生于海拔1500米山地林缘。模式标本采自峨眉。

10. 尖叶藤山柳 (新拟)

Clematoclethra faberi Franch. in Journ. de Bot. 8: 280. 1894; Kom. in Act. Hort. Petrop. 29: 93. 1908; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 387. 1915.

老枝黑色,无毛;小枝褐色,初被淡红色绒毛,后变秃净。叶卵形至卵状披针形,很少倒卵形,长5—9厘米,宽2—5厘米,顶端长渐尖,基部阔楔形、圆形至微心形,边缘具纤毛状小锯齿,腹面绿色,无毛或叶脉上有少量软刺毛及柔毛,背面淡绿色,被绒毛,密集或稀疏,沿叶脉毛被较厚;叶柄长2.5—7厘米,初被绒毛,后秃净。花序柄长2—3.5厘米,被绒毛,1—3(6)花,通常2花;小苞片披针形,被绒毛;花柄长约1厘米,密被绒毛;花白色;萼片无毛或有毛,长3毫米,宽2毫米;花瓣卵形,长6毫米。果球形,干后径约6毫米。花期6—7月,果期7—8月。

四川特有,产西部、东部和南部。生于海拔1500—2500米山地林缘灌丛中或沟谷边。模式标本采自城口和峨眉山两地。

11. 绵毛藤山柳 (新拟)

Clematoclethra lanosa Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 388—389. 1915.

老枝黑褐色,秃净;小枝初被或厚或薄的淡褐色绵毛或绒毛,后渐变秃净。叶膜质或纸质,卵形至阔卵形,长6—11厘米,宽4—8厘米,顶端短尖至渐尖,基部圆形、截平形至浅心形,边缘有纤毛状小齿,腹面绿色,叶脉上散生糙伏毛,中脉或兼被绵毛,背面被或厚或薄的绵毛,叶脉上毛被加厚,中脉上或兼有软刺毛;叶柄长2—7(10)厘米,密被绵毛,稍扁平。花序柄长约1厘米,被绵毛,着3花;花白色;萼片密被绵毛,全株的毛被花后逐渐脱落,果期仅见叶背还保存有较完整的毛被。花期6月,果期8月。

产湖北神农架和陕西太白山、佛坪等地。生于海拔1000—2500米山林中。模式标本采自湖北西部。

12. 广西藤山柳 (新种) 图版 78: 1—6

Clematoclethra guangxiensis C. F. Liang et Y. C. Chen in Addenda.