

纹。叶纸质,椭圆形、倒卵状长圆形或倒卵状披针形,长8—19厘米,宽3—5.5厘米,顶端急尖或钝,基部阔楔形,边缘有小锯齿,无毛,中脉两面均隆起;叶柄长2—5毫米。花序近伞房状,长约4厘米,生于短枝的顶部;花直径达3厘米,花柄长1.5—3厘米,近基部有关节;萼片长圆形,长1—1.4厘米,顶端钝,开放时外反,结果时呈暗红色;花瓣5片,有时7片,倒卵形,长1.3—2厘米,顶端钝或圆;雄蕊长0.9—1.2厘米,3轮排列,花丝宿存,长5—8毫米;子房10—12室,花柱圆柱形,柱头盘状,5—6裂。核果长10—12毫米,宽6—7毫米,顶端钝,基部微弯。花期3—4月,果期5—6月。

产广东西南部(包括海南岛)和广西西南部(上思、扶绥)。生山谷石旁和溪边较湿润的空旷地方,海拔300—1400米。印度东北部、巴基斯坦东部、缅甸、泰国、马来西亚北部、柬埔寨和越南南部也有。模式标本采自缅甸。

2. 赛金莲木属*——*Gomphia* Schreb.

Schreb., Gen. Pl. ed. 8 (1): 291. 1789. p. p.; Kanis, Taxon 16

(5): 420—422. 1967; Blumea 16 (1): 51—53. 1968.

灌木或小乔木,分枝扩展。单叶互生,全缘或有锯齿,两面通常光亮无毛,侧脉多数,近平行且于叶缘处弯拱连结而成明显的边脉;托叶小,基部于叶腋内连合,上部2齿裂,脱落。总状花序或圆锥花序,顶生或腋生;花萼5片,淡红色,结果时增大,宿存;花瓣5片,黄色或白色,通常旋转排列;雄蕊10枚,1轮排列,花丝极短或无,花药顶孔开裂;子房深裂,5室,每室有弯生胚珠1颗,花柱单生,柱头锥尖。核果1—2个,有时5个,环生于扩大的花托上;种子1颗,弯生,无胚乳。

本属的模式种: 齿叶赛金莲木 *Meesia serrata* Gaertn. = *Gomphia serrata* (Gaertn.) Kanis

本属约37种,主产非洲热带地区和马达加斯加,少数产亚洲南部和东南部。我国有2种,产广东海南岛。

分种检索表

- 1. 圆锥花序长达12厘米;花瓣倒卵形,顶端2浅裂,基部狭而具2耳;叶有锯齿.....
.....1. 齿叶赛金莲木 *G. serrata* (Gaertn.) Kanis
- 1. 圆锥花序长2—5厘米;花瓣长圆状披针形,顶端钝,基部无耳;叶全缘或浅波状.....
.....2. 赛金莲木 *G. striata* (v. Tiegh.) C. F. Wei

1. 齿叶赛金莲木(新拟) 裂瓣奥里木(海南植物志), 裂瓣赛金莲木(中国高等植物图鉴) 图版88: 11—13

* 属的异名: 奥里木属(中国种子植物科属辞典)。