

Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis, *Taxon* 16 (5): 422. 1967; *Blumea* 16 (1): 53—56. 1968; *Flora Malesiana* 7 (1): 105—108. 1971; — *Meesia serrata* Gaertn., *Fruct. & Sem. Pl.* 1: 344. t. 70, f. 6. 1788; — *Ouratea lobopetala* Gagnep., *Fl. Gén. Indo-Chine Suppl.* 1: 671. f. 82, 1—6. 1946; 海南植物志 1: 514. 1964.

灌木或小乔木，高2.5—7米。叶近革质，长椭圆形，长10—17厘米，宽2—5厘米，顶端短渐尖，基部楔形，边缘除基部1/3全缘外，通常有小锯齿，中脉两面隆起；叶柄短，长约5毫米。圆锥花序腋生或顶生，长9—12厘米；萼片阔椭圆形，长约5毫米，宽约3毫米；花瓣倒卵形，长约5毫米，宽约4毫米，顶端2浅裂，基部狭而具2耳；雄蕊无花丝，花药条形，具四纵棱，长约4毫米，向内稍弯拱；子房5深裂，花柱钻状，长约3毫米。核果椭圆状微肾形，长约6毫米，宽约5毫米。花期7月，果期8—12月。

产广东海南西南部(崖县、乐东、东方)。多生于花岗岩地区，溪旁或密林中，有时生山顶，海拔680米。亚洲南部和东南部也有。模式标本采自斯里兰卡。

2. 赛金莲木(中国高等植物图鉴) 奥里木(海南植物志) 图版88: 6—10

Gomphia striata (v. Tiegh.) C. F. Wei* *Comb. nov.* — *Compylocercum striatum* v. Tiegh., *Ann. Sc. Nat Bot. ser.* 8, 16: 304. 1902. — *Ouratea striata* (v. Tiegh.) Lecomte, *Fl. Gén. Indo-Chine* 1: 703. 1911; 海南植物志 1: 514. 1964.

灌木，高1—3米。叶近革质，长圆形至披针形，长9—18厘米，宽2—4.5厘米，顶端短渐尖或渐尖，基部楔形，边近全缘或浅波状，稀有不明显的疏细齿，中脉两面隆起；叶柄长3—6毫米。圆锥花序短，长2—5厘米，腋生或顶生；花直径约1厘米，柄长1—2厘米，近基部有关节；萼片卵状长圆形，长4—5毫米，顶端短尖；花瓣长圆状披针形，长5—6毫米，顶端钝，基部无耳；雄蕊无花丝，花药长约4毫米，钻状，稍弯曲；子房5深裂，柱头锥尖。核果近肾形，长5—6毫米，宽6—7毫米。花期4—11月，果期8—12月。

产广东海南东南部至中部。常生于花岗岩地区较阴蔽的森林中，海拔60—700米。越南中部也有。模式标本采自越南。

Kanis 于1968年在 *Blumea* 16 (1): 53—61. 中，将 *Ouratea striata* 和 *O. lobopetala* 归并入 *Gomphia serrata* 中，根据目前所观察到的标本，从叶有锯齿，花序较长，花瓣倒卵形，顶端2浅裂等特征来看，*G. serrata* 与 *O. lobopetala* 比较近似，但与 *O. striata* 则有明显的区别，故此我们认为 *O. striata* 还是单独成一种比较恰当。

* 中国科学院华南植物研究所卫兆芬。



1—5. 金莲木 *Ochna integerrima* (Lour.) Merr.: 1. 花枝, 2. 花, 3. 花瓣, 4. 雌蕊, 5. 果枝。6—10. 赛金莲木 *Gomphia striata* (v. Tiegh.) C. F. Wei: 6. 花枝, 7. 花, 8. 花瓣, 9. 雄蕊, 10. 花萼和雌蕊。11—13. 齿叶赛金莲木 *Gomphia serrata* (Gaertn.) Kanis: 11. 叶片, 12. 花苞, 13. 花瓣。