

产安徽、浙江、湖南、贵州、江西。模式标本采自安徽休宁与江西婺源之间的山地。在短柱茶组里，这个种的叶最小，极易识别。

34. 褐枝短柱茶

Camellia phaeoclada Chang Tax. Gen. Camellia 41—42. 1981.

灌木，高 2.5 米。嫩枝有褐色柔毛，老枝褐色。叶革质，狭长圆形，长 4—5.5 厘米，宽 1.3—1.8 厘米，先端尖锐，基部楔形，上面深绿色，发亮，多小瘤状突起，下面黄褐色，初时有长柔毛，以后变秃，有小瘤状突起，侧脉 5 对，在上下两面均不明显，边缘有细锯齿，叶柄长 3—4 毫米，有短柔毛。花无柄，白色，直径 2.5—3 厘米，苞被片 10 片，无毛，长 5—9 毫米；花瓣 5，长 1.5 厘米；雄蕊长 8—10 毫米，近离生；子房有毛，花柱无毛，长 8—10 毫米，3 浅裂。蒴果圆球形，直径 1.5 厘米，1 室，有种子 1 粒，种子球形，直径 1.2 厘米，暗褐色，果壳薄，3 片裂开，果柄极短。

产云南及四川。模式标本采自云南双柏。

本种和短柄茶 *C. brevistyla* 较接近，但叶片狭长圆形，较狭且长，先端尖锐，易于识别。

组 6. 小黄花茶组 Sect. Luteoflora Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 21 (3): 73. 1982; Chang et Bartholomew Camellias, 73. 1984.

花黄色，细小，腋生或顶生，无柄，苞被未分化为苞片及萼片，薄革质，半宿存；花瓣基部合生，不展开；雄蕊 2 轮，外轮花丝连生；子房 3 室，花柱短，分离；蒴果小，球形，种子每室 1 粒。

本组和短柱茶组 *Paracamellia* Sealy 较接近，但花黄色，花瓣基部合生，不展开，雄蕊的外轮花丝合生成短管。已知 1 种，分布于贵州。

本组模式种：小黄花茶 *Camellia luteoflora* Li 产贵州赤水县金沙乡合金。

35. 小黄花茶 (中山大学学报)

Camellia luteoflora Li ex Chang in Acta Sci Nat. Univ. Sunyatseni 21 (3): 72. 1982; Chang et Bartholomew Camellias 73. 1984.

灌木或小乔木，高 1.5—5.5 米；树皮褐色，嫩枝无毛，芽体被白色茸毛。叶长圆形或椭圆形，长 6.5—12 厘米，最长达 17 厘米，宽 1.7—5.4 厘米，最宽达 7 厘米，先端渐尖或急锐尖，基部阔楔形；中脉干后下陷，侧脉每边 6—8 条，与网脉在上面下陷；边缘有疏锯齿，齿间相隔 2.5—8 毫米；叶柄长 8—12 毫米，有褐色柔毛。花单生于叶腋或枝顶，黄色，不展开，无柄，苞被片 8—10 片，未分化为苞片及萼片，半圆形至阔椭圆形，长 4—10 毫米，被疏毛，半宿存；花瓣 7—8 片，阔椭圆形至倒卵状椭圆形，长 11—15 毫米，基部连生 4 毫米，开花时不展开，无毛，或有睫毛；雄蕊 2 轮，长 13 毫米，外轮的花丝基部连生，花丝管长 8 毫米，无毛，花药黄色，基部着生；子房 3 室，被白色