

- 51. 狭叶瘤果茶 *C. neriifolia* Chang
8. 苞片及萼片卵圆形，先端圆。
12. 叶椭圆形或长圆形，长 8—9 厘米，种子有毛，嫩枝无毛。
13. 花白色，花瓣倒卵形，果皮厚约 2 毫米 52. 倒卵瘤果茶 *C. obovatifolia* Chang
13. 花红色，花瓣长圆形，果皮厚 3—4 毫米 ... 53. 荔波红瘤果茶 *C. rubimuricata* Chang et Xu
12. 叶长卵形，长 5—6 厘米，先端长尾状，种子有毛或无毛，嫩枝有毛。
14. 叶卵状椭圆形，花长 2 厘米，萼片长 7—8 毫米、花柱 4 条，长 1.2 厘米、种子有毛
..... 54. 小瘤果茶 *C. parvimuricata* Chang
14. 叶卵状披针形，花长 4 厘米，萼片长 1.5 厘米，花柱 3 条，长 2 厘米，种子无毛
..... 55. 湖北瘤果茶 *C. hupehensis* Chang
41. 瘤果茶 图版 10: 1—3

Camellia tuberculata Chien in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. **12**: 94. fig. 3. 1939; Sealy Rev. Gen. *Camellia* 147. 1958. — *Thea* sp. Wils. in Sargent Pl. Wils. **3**: 451. 1917.

灌木，高 3 米，嫩枝无毛或略有微毛。叶薄革质，长圆形或长圆状披针形，长 8—12 厘米，宽 2.5—4.5 厘米，先端渐尖，基部楔形或阔楔形，上面干后橄榄绿色，有光泽，无毛，下面浅橄榄绿色，略有毛，有黑色腺点，侧脉 7—8 对，在上面微陷下，在下面略突起，边缘有疏细齿，齿刻相隔 2—5 毫米，叶柄长 7—10 毫米，初时有毛，以后变秃。花顶生，白色，近无柄，苞被片 10—11 片，向内逐渐增大，倒卵圆形，最外 2—3 片长 4—5 毫米，其余 8 片长 1—1.6 厘米，外面有微毛。花瓣长 2 厘米，雄蕊长 1 厘米；子房有毛，4—5 室；花柱 4—5 条，长 1.5 厘米，有毛。蒴果圆球形，直径 1.8—2.2 厘米，果皮有瘤状凸起，厚 2—2.5 毫米，每室有种子 1 个，种子半椭圆形，长 1.3—1.5 厘米，被毛；果柄极短，顶部有宿存萼片。花期 11 月。

模式标本采自四川嘉定。

42. 黎平瘤果茶

Camellia lipingensis Chang in Acta Sci Nat. Univ. Sunyatseni **23** (2): 78. 1984.

小乔木，嫩枝无毛，干后发亮。叶厚革质，狭窄披针形，长 9—12 厘米，宽 2.5—3 厘米，先端尾状渐尖，基部阔楔形或圆，上面干后绿色，略有光泽，下面黄褐色，无毛，但在中肋上有稀疏长毛，侧脉 7—9 对，在上下两面均明显，网脉不明显，边缘有细锯齿；叶柄长 8—10 毫米。花白色，顶生，近无柄，直径 5 厘米，外侧苞被片 4，干膜质，先端略尖，被柔毛；内侧苞被片卵形，长 1—1.4 厘米，先端尖，边缘多少干膜质，被柔毛；花瓣 10 片，长圆形或卵形，长 2.5 厘米；雄蕊长 1.5 厘米，外轮花丝近离生；子房被柔毛，3 室；花柱 3—5 条，离生，长 1.5 厘米，被毛或秃净。蒴果扁球形，外面有瘤状凸起，3 室，直径 2—2.5 厘米；种子每室 1 个，表面有茸毛。花期 8—9 月。

模式标本采自贵州黎平五虎山。



图版 10 1—3. 瘤果茶 *Camellia tuberculata* Chien: 1. 花枝, 2. 花, 除去雄蕊, 3. 幼果。

4—6. 尖苞瘤果茶 *Camellia acutiperulata* Chang: 4. 花枝, 5. 花柱, 6. 蒴果, 开裂。

(蔡淑琴、谢庆建绘)