

苞片4—5片，半圆形至圆形，长4—7毫米，被柔毛；萼片5—6，卵形，长达1.5厘米，被长毛，先端尖；花瓣6—7片，倒卵状长圆形，长2.5—3厘米，近无毛，或最外1—2片中肋有柔毛；外轮花丝离生；子房无毛，3—4室，花柱3—4条，长1.5—2厘米，无毛。蒴果扁球形，宽2.5—3厘米，果皮有瘤状凸起，厚2—3毫米，无毛；种子每室1个，有疏毛。花期10—11月。

模式标本采自贵州赤水，海拔1250米的山地。

本种近似瘤果茶 *C. tuberculata* Chien，但叶片侧脉平展，子房及花柱均无毛，外轮花丝离生。

51. 狭叶瘤果茶

Camellia neriifolia Chang in Acta Sci Nat. Univ. Sunyatseni 23 (2): 79. 1984.

小乔木，嫩枝无毛，干后有光泽。叶薄革质，狭披针形，长7—11厘米，宽2—2.5厘米，先端尾状渐尖，基部阔楔形或近圆形，上面深绿色，暗晦或稍发亮，下面黄绿色，无毛，侧脉每边7—9条，在上面明显，在下面能见，网脉在上下两面均不明显，全缘，叶柄长约1厘米。花顶生，无柄；苞片4，干膜质，先端略圆，长4—7毫米，略被毛；萼片5，卵形，长1—1.2厘米，先端略尖，被丝毛；花瓣及雄蕊未见；花柱3条，离生，无毛。蒴果无毛，表面有瘤，3室；果皮厚5毫米。

模式标本采自贵州赤水金沙的沙田，海拔1100—1200米的山地杂木林。

本种的外形近似黎平瘤果茶 *C. lipingensis* Chang，但后者的叶片厚革质，边缘有锯齿，子房有毛。

52. 倒卵瘤果茶

Camellia obovatifolia Chang Tax. Gen. Camellia 48. 1981. — *C. litchi* Chang, l. c. 50, 1981. — syn. nov.

小乔木，嫩枝无毛。叶薄革质，倒卵状披针形或倒披针形，长6—9厘米，宽2.5—3.5厘米，先端短锐尖，基部楔形，上面干后稍发亮，下面无毛，侧脉7—9对，干后在上面突起，在下面不明显，边缘有尖锯齿，齿刻相隔2—4毫米，叶柄长4—5毫米，无毛。花顶生，近无柄，白色，苞片及萼片9—10片，最下面4片阔卵形，无毛，其余阔倒卵形，最长达1.2厘米，外面有灰白色茸毛；雄蕊及花瓣均已脱落；子房3室，近秃净，或近顶端有疏毛，有瘤状凸起；花柱3条，离生，无毛。蒴果宽2—3厘米，果皮皱折，厚2毫米，种子表面有毛。

模式标本采自云南文山平寨一带，海拔600—750米的山地。

本种叶倒卵状披针形，长不超过10厘米，宽不超过4厘米，干后叶面发亮，萼片倒卵圆形，被灰白色柔毛，长1.2厘米，子房无毛。

53. 荔波红瘤果茶 图版11: 3—6

Camellia rubimuricata Chang et Z. R. Xu in Guihaia 5 (4): 347. 1985.