

58. 叶披针形，具钝锯齿，先端长尾状，果实小
 110. 长尾红山茶 *C. longicaudata* Chang et Liang

亚组 1. 滇山茶亚组 Subsect. *Reticulata* Chang Tax. Gen. *Camellia*, 56, 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 76, 1984.

子房被毛，果皮褐色，被毛，厚革质。

本组有 43 种，分为 2 个系。

系 1. 毛蕊系 Ser. *Villosae* Chang Tax. Gen. *Camellia*, 56. 1981.

外轮花丝管或游离花丝被毛，子房被毛。本系有 9 种。

本系模式种：*Camellia villosa* Chang et Liang

56. 金沙江红山茶

Camellia jinshajiangica Chang et S. L. Lee in Acta Nat. Sci. Univ. Sunyatseni 28 (3): 50. 1989.

灌木，高约 2 米，嫩枝有长茸毛；后变秃净，顶芽有茸毛。叶革质，椭圆形或卵状椭圆形，长 9—12 厘米，宽 4.5—6.5 厘米，先端急尖，基部钝或近圆形，通常为阔楔形，上面干后深绿色，稍发亮，下面褐绿色，有长茸毛，或变秃净；侧脉 6—8 对，与网状小脉在上面不明显，在下面稍突起；边缘有锯齿；叶柄长 6—8 毫米，略被茸毛。花红色，生于枝顶叶腋，近无柄；苞片及萼片 10 片，阔倒卵形，最长 1.5—2 厘米，被灰黄色长茸毛；花瓣 6 片，阔倒卵形，长 3.5 厘米，外侧 2—3 片在内外两面均略被柔毛，基部近连生；雄蕊长 2—2.5 厘米，花丝管长 1 厘米，与柔离花丝均有柔毛；子房 4—5 室，被茸毛；花柱长 3 厘米，无毛，顶端 3—5 裂，裂片长 5—6 毫米。果未见。

模式标本采自四川攀枝花市近郊的小宝鼎；海拔 1 650 米的灌丛中。

本种近似峨眉红山茶 *C. omeiensis* Chang，但花较小，花瓣数目较少，子房 5 室。

57. 峨眉红山茶 图版 13: 1—2

Camellia omeiensis Chang Tax. Gen. *Camellia* 56. 1981, Chang et Bartholomew, *Camellias*, 77, 1984.

灌木或小乔木，高 4 米，嫩枝无毛，深褐色。叶革质，椭圆形，长 9—12 厘米，宽 4—4.5 厘米，先端急短尖，尖头略钝，基部圆或钝，上面干后深绿色，略有光泽或稍暗晦，无毛，下面褐色，无毛；侧脉 6—7 对，与网脉在上面略陷下，在下面突起，叶缘具钝齿，齿刻相隔 2—3 毫米；叶柄长 1—1.5 厘米，扁平，无毛。花顶生，红色，长 5—6 厘米，直径 9 厘米，无柄；苞片及萼片 10 片，下部 3—4 片半圆形，长 3—6 毫米，背面有绢毛，其余各片近圆形，长 1.5—2 厘米，有绢毛，花开放后脱落；花瓣 8—9 片，最外侧 2—3 片近圆形，长 3—3.5 厘米，背面有绢毛，其余 6—7 片阔倒卵圆形，长 4—4.5