

63b. 白花毛蕊红山茶 (变种) 图版 15: 6—9

var. *alba* Chang Tax. Gen. *Camellia* 60. 1981.

叶长圆形，侧脉 5—7 对；花白，苞及萼 8 片，花瓣 7 片，外轮花丝有毛，子房 3 室，有毛，花柱无毛，顶端 3 裂。花期 11 月。

模式标本采自四川峨眉山，海拔 1 650 米，初殿右侧。

64. 长毛红山茶

Camellia villosa Chang et S. Y. Liang ex Chang l. c. 60. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*. 80, 1984.

灌木或小乔木，嫩枝秃净，老枝灰色。叶革质，长圆形，长 7—9.5 厘米，宽 3—4 厘米，先端急尖，尖尾长 8—10 毫米，基部圆形或钝，上面干后褐色，无毛，稍发亮，下面同色，有长柔毛，中脉下陷，侧脉 9—10 对，几与中脉垂直，在上面凹下，在下面突起，边缘除基部 1/3 外有锯齿，齿刻相隔 1—2 毫米，叶柄长 5—7 毫米，上面无毛，下面有毛。花红色，顶生，无柄，苞片及萼片 14 片，卵圆形，最长达 1.3 厘米，外面有绢毛；花瓣 7 片，倒卵形，长 3—3.5 厘米，外面有柔毛；雄蕊排成 4 轮，长 2.5 厘米，花丝管有毛，内轮游离花丝有毛；子房有毛，3 室，每室有胚珠 5—6 个；花柱长 1.5 厘米，3 裂。蒴果圆球形，直径 5 厘米，褐色，有长毛，3 室，每室有种子 3—4 粒，3 片裂开，果片厚 5 毫米，不具宿存苞片及萼片；果柄极短，种子长 1.5—2 厘米，褐色。

产贵州榕江、湖南雪峰山、广西。模式标本采自广西龙胜蛮山。

本种的嫩枝无毛。叶长圆形，长 7—9.5 厘米，背面有长毛，苞及萼片 14 片，花瓣 7 片，花丝管有毛，蒴果褐色，圆球形。它和石果红山茶 *C. lapidea* 及毛蕊红山茶很接近，但后者的苞片及萼片只有 10 片，叶背无毛。它和多齿红山茶 *C. polyodonta* 更接近，后者叶大，背面无毛，花和果均较大。

系 2. 滇山茶系 Ser. *Reticulatae* Chang Tax. Gen. *Camellia*, 61, 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 83, 1984.

外轮花丝管或游离花丝无毛，子房被毛。本系有 34 种。

本系模式种：滇山茶 *C. reticulata* Lindl.

65. 毛籽红山茶

Camellia trichosperma Chang l. c. 64. 1981; Chang et Bartholomew, l. c. 88, 1984.

乔木，高 15 米，树皮灰白，嫩枝无毛。叶革质，椭圆形，长 11—13 厘米，宽 4.5—5.5 厘米，先端急锐尖，尖头长 1 厘米，基部楔形，上面干后黄绿色，不发亮，下面浅黄绿色，侧脉 5—6 对，在上下两面均明显，网脉不明显，边缘上半部有细锯齿，叶柄长 1—1.3 厘米。花红色，顶生，无柄。苞片及萼片 9—10 片，阔卵形，长 1.5 厘米，被黄褐色毛；子房 4—5 室，无毛。蒴果大，球形，直径 10—15 厘米，4—5 片裂开；果片厚 2—