

本种与怒江红山茶 *C. saluenensis* 的区别，在于叶片卵状椭圆形，基部圆形，苞及萼片较少，花瓣略多。

68. 白毛红山茶 图版 15: 1—5

*Camellia albovillosa* Hu ex Chang Tax. Gen. *Camellia* 62. 1981; Chang et Bartholomew l. c. 86, 1984.

灌木，高 1—2 米，嫩枝有毛。叶革质，椭圆形，长 6—10 厘米，先端急短尖，基部近圆形，上面干后稍发亮，下面初时有柔毛；侧脉 8—10 对，边缘有细锯齿，叶柄长 7—8 毫米。花顶生，无柄，红色；苞片及萼片 12 片，干膜质，长 4—12 毫米，被灰白色绢毛；花瓣 7—8 片，倒卵形，长 3—3.5 厘米，外面 3—4 片有毛；雄蕊长 2—2.5 厘米，外轮花丝有短管，无毛；子房有毛，花柱长 1—1.5 厘米，顶端 3—5 裂，无毛。花期 11 月。

模式标本采自云南元江，洼垭，海拔 1 200 米山地。

本种与滇山茶 *C. reticulata* 的区别在于嫩枝有毛，苞片及萼片较多，被灰白色绢毛。

69. 贵州红山茶 图版 17: 1—2

*Camellia kweichouensis* Chang l. c. 61. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 83, 1984.

小乔木，高 5 米，嫩枝无毛，老枝灰白色。叶革质，长圆形，长 6—10.5 厘米，宽 3—4 厘米，先端略尖或渐尖，基部阔楔形或近圆形，发亮，无毛，侧脉 6—7 对，边缘有细锯齿，叶柄长 8—12 毫米。花红色，无柄，直径 10 厘米；苞片及萼片 9—10 片，革质，半圆形至阔卵形，长 5—17 毫米，外面有灰黄色茸毛；花瓣 9 片，倒卵形，外 3 片长 3—3.5 厘米，内 6 片长 5—6 厘米，先端圆，背面有微毛，基部连生 1—1.5 厘米；雄蕊长 2—2.5 厘米，花丝管长 5 毫米，无毛；子房 5 室，被茸毛；花柱长 2 厘米，无毛，先端 5 裂；蒴果扁球形（未成熟），宽 3 厘米，高 1.8 厘米，有 5 条浅沟，5 室，每室有种子 1—2 个。

模式标本采自贵州清镇九龙山。

苞及萼革质，10 片；花瓣 9 片，长达 6 厘米，花丝及花丝管均较短；子房 5 室，花柱 5 裂；蒴果扁球形，5 室，是红山茶组少数的 5 室蒴果的代表之一。

70. 陈氏红山茶

*Camellia chunii* Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni, 28 (3): 52, 1989.

70a. 陈氏红山茶（原变种）

var. *chunii*

小乔木，高 3—4 米，嫩枝初时有微毛，后变秃净。叶革质，卵形，长 7—9 厘米，宽 3—4 厘米，上面干后深绿色，略有光泽，下面褐绿色，有稀疏长毛，先端急锐尖，基部圆形，侧脉 5—6 对，在上面能见，在下面突起，网脉在上下两面均不明显，边缘有细锯齿，叶柄长约 5 毫米，有柔毛。花红色，生于枝顶叶腋，直径 4—5 厘米，近无柄；苞片