

3.5 厘米, 3 片裂开, 果片厚 6—8 毫米; 种子每室 1—2 粒。花期 12 月。

模式标本采自四川西昌螺髻山的山沟疏林中, 海拔 2 100 米。

79. 西南红山茶 黄缸 (日本)

Camellia pitardii Coh. St. in Meded. Proefst. Thee **10**: 68. 1916. — *Thea speciosa* Pitard ex Diels in Bull. Roy. Bot. Gard. Edinb. **5**: 286. 1912. — *Camellia japonica* Lévl. pro. parte. Fl. Kouy-Tcheou 271. 1917. — *Thea cavaleriana* Lévl. Cat. Pl. Yunnan 271. 1917, in nota. — *Thea pitardii* (Coh. Stuart) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **5**: 236. 1924. — *Camellia speciosa* (Pitard ex Diels) Melchior in Notizbl. Bot. Gard. Berlin **9**: 453. 1925. *C. rubo-anthera* Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni, **23** (2): 81, 1984, syn. nov. — *C. huiliensis* Chang, l. c. **28** (3): 153, 1989, — syn. nov. — *C. subliberipetala* Chang, l. c. **28** (3): 56, 1989. — syn. nov. — *C. hunanica* Chang, l. c. **29** (2): 88, 1990. — syn. nov.

79a. 西南红山茶 (原变种)

var. **pitardii**

灌木至小乔木, 高达 7 米, 嫩枝无毛。叶革质, 披针形或长圆形, 长 8—12 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 有时较长, 先端渐尖或长尾状, 基部楔形, 上面干后亮绿色, 下面黄绿色, 无毛, 侧脉 6—7 对, 在上下两面均能见。边缘有尖锐粗锯齿, 齿刻相隔 2—3.5 毫米, 齿尖长 0.5—1.5 毫米, 叶柄长 1—1.5 厘米, 无毛。花顶生, 红色, 无柄; 苞片及萼片 10 片, 组成 2.5—3 厘米的苞被, 最下半 1—2 片半月形, 内侧的近圆形, 长约 2 厘米, 背面有毛, 脱落; 花瓣 5—6 片, 花直径 5—8 厘米, 基部与雄蕊合生约 1.3 厘米; 雄蕊长 2—3 厘米, 无毛, 外轮花丝连生, 花丝管长 1—1.5 厘米, 基部与花瓣贴生; 子房有长毛, 花柱长 2.5 厘米, 基部有毛, 先端 3 浅裂。蒴果扁球形, 高 3.5 厘米, 宽 3.5—5.5 厘米, 3 室, 3 片裂开, 果片厚; 种子半圆形, 长 1.5—2 厘米, 褐色。花期 2—5 月。

产四川、湖南、广西、贵州。模式标本采自贵州平坝。

79b. 西南白山茶

var. **alba** Chang, l. c. 69, 1981; Chang et Bartholomew. l. c. 94, 1984.

和原变种的区别在于花白色, 模式标本采自湖南保靖簸箕。

79c. 窄叶西南红山茶 (变种)

var. **yunnanica** Sealy in Kew Bull. 219. 1949, Rev. Gen. Camellia. 187. 1958.

本变种的叶片长圆形或披针形, 嫩枝常有微毛。

产云南、四川、贵州。

80. 香港红山茶 广东山茶 (中国高等植物图鉴) 图版 20: 1—3

Camellia hongkongensis Seem. in Trans. Linn. Soc. London **22**: 342. t. 60. 1859; Dunn & Tutcher Fl. Kwangtung & Hongkong 46. 1912. — *Thea hongkongensis*