

Rev. Gen. Camellia 185. 1958. — *Thea camellia* var. *lucidissima* Lévl. Cat. Pl. Yunnan 270. 1917. — *Camellia speciosa* Hort Gard Chron. 3. 87; 297, 1930. — *Thea pitardii* (Coh. st.) Rehd; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 393. 1931. — *Camellia saluenensis* form. *minor* Sealy l. c. — *C. weiningensis* Li ex Chang Tax. Gen. Camellia 42. 1981. — syn. nov. — *C. grabriperulata*, Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 23 (2): 77. 1984. — syn. nov. — *C. minor* Chang. l. c. 28 (3): 53, 1989. — syn. nov.

灌木至小乔木，高2—5米，嫩枝通常有毛，偶或早秃。叶革质，长圆形，长3.5—6厘米，宽1—2.2厘米，先端略尖或钝，基部阔楔形或圆，上面干后绿色，发亮，下面至少在中脉基部有毛，侧脉6—7对，在上面能见，在下面突起，边缘有细锯齿，叶柄长4—5毫米，有褐色柔毛。花顶生，红色或白色，无柄；苞片及萼片8片，组成长约1.5—2厘米的苞被，外面通常无毛，革质；花瓣长2.5—3.5厘米，6—7片，基部与雄蕊连生约1—1.2厘米，最外侧1—2片外面有毛，其余无毛，先端凹入或圆形。雄蕊长1.5—2厘米，外轮花丝连生，有短管，游离花丝无毛；子房有毛，花柱长1—1.5厘米，上部无毛，3裂。蒴果圆球形，3室，直径2.5厘米，如为哑铃形，则宽3厘米，2室，种子每室1—2粒，半圆形，长1厘米，褐色。

模式标本采自云南腾冲，分布到四川南部。

本种的叶较短小，嫩枝有毛，叶背亦有毛，花红色或白色，苞片及萼片无毛，或仅有稀疏短毛。它和西南红山茶 *C. pitardii* 很接近，后者的嫩枝及叶无毛，叶稍宽大，先端急尖，锯齿锐利，花萼通常显著被毛。果实较大。

88. 白丝毛红山茶

Camellia albo-sericea Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 28 (3): 51. 1989. — *C. xichangensis* Chang, l. c. 57.

灌木，高2米，嫩枝初时有柔毛，后变秃净，顶芽被白色丝毛。叶革质，长圆形或披针形，长7—10厘米，宽3—4厘米，先端急短尖，尖头钝，基部楔形或钝；上面干后略有光泽，下面黄绿色，初时有长茸毛，后变秃净；侧脉7—8对，在上面不明显，在下面能见，网脉不明显；边缘有细锯齿，叶柄长5—6毫米，被毛。花红色，近顶生，直径5—6厘米，无柄；苞片及萼片8—9片，最长的达1.7厘米，被白色长丝毛；花瓣6—7片，倒卵形，长3—3.5厘米，基部连生5—6毫米，外侧被白丝毛；雄蕊长2厘米，花丝管长1厘米，无毛；子房3室，被茸毛，花柱长1.5—2厘米，顶端3裂，蒴果球形，3片裂开，果片木质，厚约8毫米。花期1月。

模式标本采自四川攀枝花市的小宝鼎，海拔1550米的山地疏林。

本种和短轴红山茶 *C. brevicoluma* Chang, Liu et Zhang 较接近，但叶片较狭窄，花瓣较少，萼片及花瓣被白丝毛，子房3室。

89. 白灵山红山茶