

分种检索表

1. 子房有毛。

2. 叶有柄，基部楔形，果壳薄，种子无毛 111. 滇缅离蕊茶 *C. wardii* Kobuski

2. 叶无柄，基部心形或耳形，长 3—5 厘米，果圆球形，种子有毛
..... 112. 毛籽离蕊茶 *C. pilosperma* S. Y. Liang ex Chang

1. 子房无毛。

3. 叶椭圆形或倒卵形，先端圆或钝，基部楔形，嫩枝无毛，苞被革质
..... 113. 腺叶离蕊茶 *C. paucipunctata* (Merr. et Chun) Chun

3. 叶长卵形，基部近圆形或阔楔形，苞被干膜质或革质。

5. 侧脉 5—6 对，花瓣长 2 厘米。

6. 花瓣 5 片，长 2 厘米，叶长 4—5.5 厘米 114. 五数离蕊茶 *C. pentamera* Chang

6. 花瓣 9 片，长 2 厘米，叶长 5—7 厘米 115. 膜萼离蕊茶 *C. scariosisepala* Chang

5. 侧脉 9—11 对，叶长 5—7 厘米，花瓣 6—8 片，长 4—11 毫米
..... 116. 尖齿离蕊茶 *C. acutiserrata* Chang

111. 滇缅离蕊茶 图版 26: 4—5

Camellia wardii Kobuski in Brittonia 4: 114. 1941; Sealy Rev. Gen. Camellia 158—

159. fig. 74. 1958.

灌木至小乔木，高 6—12 米，嫩枝无毛。叶革质，狭椭圆形或椭圆倒披针形，长 7—11 厘米，宽 2.1—3.8 厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部楔形或阔楔形，上面深绿色，无毛，下面浅绿色，无毛，或沿中脉有疏长毛；侧脉 7—8 对，在两面均明显，边缘密生细锯齿，齿刻相隔 1.5 毫米，叶柄长 8—11 毫米，无毛。花顶生或腋生，直径 3.5—4 厘米，白色，近无柄；苞片及萼片 8 片，至少宿存至花开放之后，从半圆形长 2.5 毫米至圆形长 10—12 毫米，背面略有短柔毛，边缘有睫毛；花瓣 6—8 片，长 2 厘米，基部与花丝连生约 3 毫米，最外 1—2 片萼片状，倒卵形，长 1—1.5 厘米，宽 1 厘米，其余花瓣卵形，先端圆或微凹入，长 1.5—2 厘米，宽 4—13 毫米；雄蕊长 1.3 厘米，无毛，外轮花丝基部与花瓣连生 3—5 毫米；子房有长粗毛；花柱 3 条，长 6—8 毫米，基部有毛。花期 10—11 月。

产云南怒江流域，海拔 2 150—2 550 米山地。模式标本采自缅甸。

112. 毛籽离蕊茶 图版 26: 1—3

Camellia pilosperma S. Y. Liang ex Chang Tax. Gen. Camellia 88. 1981; Chang et Bartholomew Camellias, 113, 1984.

灌木，高 1—3 米，嫩枝有褐色长粗毛，老枝灰色，表皮薄条状剥落。叶革质，椭圆形或卵状长圆形，长 3—5 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，先端略尖或稍钝，基部心形或耳形，



图版 26 1—3. 毛籽离蕊茶 *Camellia ptilosperma* S. Y. Liang ex Chang; 1. 花枝, 2. 花萼及花柱, 3. 雄蕊。4—5. 滇缅离蕊茶 *Camellia wardii* Kobuski; 4. 花枝, 5. 蒴果。

(蔡淑琴绘)