

耳长 3—5 毫米，上面干后暗褐色，不发亮，中脉基部有短粗毛，下面褐色，中脉有长丝毛，侧脉 7—8 对，在上面陷下，在下面略突起，边缘有疏锯齿，齿刻相隔 2.5—3.5 毫米，叶柄极短。花顶生，白色，常 2 朵并列，或单花腋生，花梗极短；苞被 9 片，外侧数片长 1.5—2 毫米，无毛，半圆形或阔卵形，内侧数片卵圆形，长 3.5—4 毫米，无毛，基部近分离，宿存；花瓣 5—7 片，倒卵形，长 1.2—1.5 厘米，近于离生，先端凹入，无毛；雄蕊长 8—10 毫米，外轮花丝基部 2 毫米连生，无毛，内轮完全分离，花药基部着生，黄色；子房 3 室，有毛，花柱长 7—10 毫米，几完全分离为 3。蒴果圆球形，直径 7—9 毫米，不规则裂开，果片薄，1 室，种子 1 粒，圆球形，直径 5—6 毫米，表面有短毛。花期 11—12 月。

模式标本采自广西昭平南荣乡，低海拔的山地常绿林。

嫩枝有粗毛，叶细小椭圆形，基部耳形，花近无柄，苞被未分化为苞或萼片，宿存，花瓣 5—7，几分离，雄蕊无毛，外轮花丝仅基部略连生，子房有毛，3 室，果实细小，种子有毛。

113. 腺叶离蕊茶 (中山大学学报)

Camellia paucipunctata (Merr. et Chun) Chun in Sunyatsenia 4: 187. 1940. Chang Tax. Gen. Camellia. 89, 11981; Chang et Bartholomew, l. c. 113. 1984. — *Thea paucipunctata* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 285. t. 62. 1935, exel. specimen H. Fung 20336.

小乔木，高 8 米，嫩枝无毛。叶硬革质，椭圆形至倒卵形，长 5—9 厘米，宽 2—5 厘米，先端圆或钝，有时略尖，基部阔楔形，上面干后绿色，发亮，无毛，下面同色，发亮，无毛，有散生黑腺点，侧脉 6—7 对，与网脉在上面明显，在下面稍突起，边缘有细钝齿，齿刻相隔 3—4 毫米，叶柄长 5—7 毫米，无毛。花单生于枝顶，近无柄，白色，直径 4—4.5 厘米，苞被 9 片，外侧数片长 2—3 毫米，无毛，内侧数片圆形，长 1—1.5 厘米，无毛，离生，花瓣 6 片，阔倒卵形，长 2—2.5 厘米，宽 1.3—1.8 厘米，外侧 2 片较短小，无毛，雄蕊多轮，无毛，除基部 2 毫米与花瓣连生外，全部游离，长 1.5 厘米；子房无毛，花柱 3 条，长 9 毫米，无毛。蒴果圆球形，直径 4 厘米，3 室，果皮厚 6—7 毫米，有宿存萼片。花期 12 月。

模式标本采自海南崖县南山岭，海拔 300 米的山地常绿林。

114. 五数离蕊茶 (中山大学学报)

Camellia pentamera Chang Tax. Gen. Camellia 90. 1981; Chang et Bartholomew Camellias, 114, 1984.

乔木，高 15 米，胸径 20 厘米，嫩枝有毛。叶革质，卵状椭圆形，长 4—5.5 厘米，宽 1.7—2.3 厘米，先端渐尖，尖头钝，基部钝或近圆形，上面干后无光泽，中脉有短毛，下面无毛，侧脉 5—6 对，不明显，边缘有锯齿。叶柄长 4—5 毫米，无毛。花单生于枝