

5—10片，基部连生；雄蕊短，2轮，长4—8毫米，稍连生；子房无毛或有毛，3—5室，花柱极短，长1—4毫米；蒴果3—5片裂开。

本组模式种：短蕊茶 *C. brachyandra* Chang，产海南南部甲子岭

本组有11种，我国有9种。本组和短柱茶组 *Paracamellia* 容易混淆，后者的苞及萼在花后脱落，花瓣近离生，雄蕊的花丝粗而短，花柱亦特别短。

分种检索表

1. 子房被毛。

2. 嫩枝被毛，叶长圆形或长卵形，长4—9厘米，苞及萼7—11片。

3. 叶长6—9厘米，侧脉7—8对，花瓣5片，花柱长1毫米 117. 瘤叶短蕊茶 *C. muriculata* Chang

3. 叶长4—6厘米，侧脉5—6对，花瓣7片，花柱长3—4毫米 118. 思茅短蕊茶 *C. szemaoensis* Chang

2. 嫩枝无毛，叶椭圆形或长圆形。

4. 花白色，叶椭圆形，苞及萼6片，果壳厚5—7毫米 119. 厚短蕊茶 *C. pachyandra* Hu

4. 花黄色，叶长圆形，苞及萼7—9片，果壳厚2—3毫米 120. 黄花短蕊茶 *C. xanthochroma* Feng et Xie

1. 子房无毛。

5. 嫩枝无毛，叶长达20厘米。

6. 叶基部心形，抱茎，无叶柄 121. 抱茎短蕊茶 *C. amplexifolia* Merr. et Chun

6. 叶基部圆形，叶柄长5毫米 122. 短蕊茶 *C. brachyandra* Chang

5. 嫩枝有毛，叶长5—11厘米，稀达16厘米。

7. 花柄长2毫米，花瓣革质，叶长圆形，先端长尾状 123. 厚瓣短蕊茶 *C. crassipetala* Chang

7. 花无柄，花瓣纸质，叶较小，先端短尖。

8. 叶小，椭圆形，长4厘米，花瓣长16毫米 124. 元江短蕊茶 *C. yankiangensis* Chang

8. 叶长圆形，长4—8厘米，花瓣长8毫米 125. 细花短蕊茶 *C. parviflora* Merr. et Chur ex Sealy

117. 瘤叶短蕊茶 (中山大学学报)

Camellia muriculata Chang Tax. Gen. *Camellia* 93. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias* 117. 1984.

小乔木，高8—12米，嫩枝有短柔毛。叶薄革质，椭圆形或长圆形，长6—9厘米，

宽 2.5—3.5 厘米，先端急锐尖，基部阔楔形，上面暗绿色，下面沿中脉有柔毛，侧脉 7—8 对，边缘有尖锐锯齿，叶柄长 5—7 毫米，有柔毛。花腋生，白色，近无柄，苞片 3—4 片，无毛，萼片 5 片，倒卵形，长 4—5 毫米，无毛；花瓣 5 片，长 1—1.2 厘米，椭圆形；雄蕊长 7—8 毫米，外轮花丝基部连生 3—4 毫米，无毛；子房被毛，3 室，花柱 3 条，离生，长 1 毫米。

模式标本采自云南盈江县昔马乡昔马前山，海拔 1 700 米的杂木林。

118. 思茅短蕊茶 (中山大学学报)

Camellia szemaoensis Chang Tax. Gen. *Camellia* 94. 1981; Chang et Bartholomew *Camellia* 118. 1984.

灌木或小乔木，嫩枝有毛。叶革质，倒卵状长圆形，长 4—6 厘米，宽 1.5—2 厘米，先端渐尖，基部楔形，有时近圆形，上面干后橄榄绿色，下面有疏长毛，侧脉 5—6 对，两面均不明显，边缘有细锯齿，叶柄长 4—5 毫米，被毛。花无柄，苞片 2，无毛；萼片 5，阔卵形，长 5—6 毫米，略有毛，边缘干膜质；花瓣 7 片，倒卵形，长约 1 厘米；雄蕊长 8 毫米，花丝有短管，无毛；子房有毛，花柱长 3—4 毫米。蒴果球形，直径 2—2.5 厘米，3—4 片裂开，无毛，果片厚 5—7 毫米，每室有种子 1 个。花期 1—2 月。

模式产云南思茅西山，分布于海拔 760—930 米的山谷疏林中。亦见于普文。

119. 厚短蕊茶 图版 27: 1—4

Camellia pachyandra Hu in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. 8: 131. 1938; Chang l. c. 95. 1981; Chang et Bartholomew l. c. 118, 1984.

乔木，高 10 米，嫩枝无毛。叶薄革质，椭圆形或卵形，长 8—11.5 厘米，宽 3.5—4.5 厘米，先端短尖，基部阔楔形，上面深绿色，无毛，下面沿中脉有长毛，侧脉 7—8 对，在两面均明显，边缘有细锯齿，叶柄长 5—6 毫米，上面有柔毛。花生于枝顶叶腋内，花柄短，无毛；苞片及萼片 6 片，最外侧 2 片，对生，相当于苞片，阔卵形，长 2—4 毫米，边缘膜质，内侧 4 片相当于萼片，近圆形，长 4—6 毫米，无毛；花瓣 6 片，白色，卵形至倒卵形，长 9 毫米，宽 6 毫米，基部连生；雄蕊长 6 毫米，无毛，花丝基部连生；子房有毛，花柱单生，长 1.5 毫米，先端 3 裂。蒴果三角球形，直径 3.3 厘米，无柄，有宿存苞片及萼片，1 室，有种子 1 粒，果片厚 5—7 毫米。

模式标本采自云南耿马、勐海一带，海拔 1 500—1 800 米的杂木林。

120. 黄花短蕊茶

Camellia xanthochroma Feng et Xie in Acta Bot. Yunnan 4 (4): 423—424. fig. 1. 1981.

灌木或小乔木，树皮浅褐色，平滑，嫩枝无毛。叶革质，长圆形或长圆状披针形，长 6.5—12 厘米，宽 2.2—3.7 厘米，先端钝，基部阔楔形，上面绿色，下面浅绿色，无毛；侧脉 7—9 对，在上面稍下陷，在下面明显；边缘近先端有细锯齿，叶柄长 3—7 毫米。花