

黄色，直径 1.2 厘米，单生于枝顶叶腋，花柄极短，长不过 1.5 毫米；苞片与萼片 7—9 片，薄革质，半圆形至阔卵形，长 3—3.5 毫米，边缘膜质；花瓣 6 片，阔卵形，长 7 毫米；雄蕊 12—16 枚，花丝粗壮，肉质，长 1—1.5 毫米；子房 2—4 室，被灰白色茸毛，花柱 2—4 条，离生，长 2 毫米。蒴果扁三角球形，高 8 毫米，宽 1 厘米，有宿存萼片，3—4 片裂开，果片厚 2—3 毫米。花期冬春间。

模式标本采自海南崖县三龙水库，海拔 160 米的疏林。

121. 抱茎短蕊茶

Camellia amplexifolia Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 129. fig. 13. 1940; Chang Tax. Gen. *Camellia* 95. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias* 118. 1984.

灌木至小乔木，高 4 米，嫩枝无毛，褐色。叶革质，长圆形或长圆状披针形，长 9—23 厘米，宽 3—6.5 厘米，先端稍窄而钝，有时略尖，基部心形，抱茎，上面干后绿褐色，无光泽，无毛，下面褐色，无毛，侧脉 9—11 对，在上面能见，在下面突起，边缘疏生细锯齿，齿刻相隔 3—4 毫米，无叶柄。花顶生或腋生，花柄长 2—2.5 毫米；苞片 2—3 片，贴近萼片，半圆形，长 1.5 毫米，无毛；花萼 5 片，半圆形至圆形，长 3—5 毫米，无毛，花瓣黄白色，6 片，长 6—7 毫米，阔倒卵形，基部与花丝相连生；雄蕊极短，花丝大部分与花瓣相连，无毛，游离花丝长 1—2 毫米，花药卵圆形，长 1 毫米；子房无毛，花柱长 3 毫米，分离为 3 条。花期 5—6 月。

模式标本采自海南保亭县太平崆的张槎村，海拔 330 米的山谷疏林中。

122. 短蕊茶 图版 27: 5—6

Camellia brachyandra Chang Tax. Gen. *Camellia* 95. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias* 120. 1984.

灌木，高 2 米，嫩枝无毛。叶革质，狭椭圆形，长 14—19.5 厘米，宽 5.5—6.5 厘米，先端钝或锐尖，基部钝或圆形，上面深绿色，干后暗绿色，不发亮，无毛，下面浅绿色，无毛，侧脉 11—13 对，在上面能见，在下面稍突起，全缘，叶柄长约 5 毫米，无毛。花 1—2 朵生于枝顶叶腋，细小，花柄长 2—3 毫米，无毛；苞片 2 片，贴紧在花萼基部，阔卵形，长 2 毫米，宿存；萼片 6 片，近圆形，长 3—4 毫米，无毛，均宿存；花瓣 7—8 片，倒卵圆形，外侧 2—3 片几离生，内侧 4—5 片基部相连生；雄蕊极短，花丝下半部与花瓣基部连生，无毛，花药基部着生。子房无毛，3 室，花柱 3 条，长 1—2 毫米。花期 7—8 月。

模式标本采自海南南部甲子岭，海拔 150 米的山谷溪边密林下。

很接近细花短蕊茶 *C. parviflora*，但嫩枝无毛，叶片大得多，全缘，花瓣较多，7—8 片，子房无毛；和抱茎短蕊茶 *C. amplexifolia* 更接近，后者叶无柄，基部抱茎，心形，边缘有锯齿，花瓣较少。

123. 厚瓣短蕊茶

Camellia crassipetala Chang l. c. 96. 1981; Chang et Bartholomew l. c. 122. 1984.

小乔木，嫩枝有毛。叶薄革质，长圆形，长5—8厘米，宽2—3厘米，先端近尾状渐尖，基部阔楔形，上面不发亮，中脉有毛，下面初时有毛，以后变秃，侧脉7—8对，不明显，边缘有细锯齿，叶柄长3毫米，有毛。花单生于枝顶叶腋内，直径2厘米，花柄长2毫米，苞片2，细小，宿存；萼片5，近圆形，长3—5毫米，有睫毛；花瓣5，倒卵圆形，长1厘米，革质，无毛；雄蕊长4—5毫米，花丝增厚，基部略连生，无毛；子房无毛，3室，花柱极短。花期10月。

模式标本采自云南临沧县保善，海拔2700米的常绿林。

本种与厚蕊蕊茶 *C. pachyandra* 的区别在于嫩枝有毛，花瓣厚革质，子房无毛；它与短蕊茶 *C. brachyandra* 的区别在于嫩枝有毛，叶片很小，花瓣较少，雄蕊则较长。

124. 元江短蕊茶

Camellia yankiangensis Chang l. c. 97. 1981; Chang et Bartholomew l. c. 129. 1984.

灌木或小乔木，高2米，嫩枝有毛。叶革质，椭圆形，长3—4.5厘米，宽1.5—2.3厘米，先端短尖，基部阔楔形，上面干后无光泽，沿中脉有短柔毛，下面无毛，侧脉不明显，边缘有细钝齿，叶柄长3—4毫米，有毛。花白色，单生于枝顶叶腋，近无柄；苞片2，阔卵形，长2毫米；萼片5，阔卵形或近圆形，革质，长4—5毫米，有柔毛；花瓣5片，阔倒卵形，长1.4—1.8厘米，宽1.2—1.6厘米，有短柔毛；雄蕊2轮，长5—6毫米，花丝粗厚，基部1/3连生，无毛；子房无毛，花柱极短。花期10月。

模式标本采自云南元江县和平水库至木枋河，疏林中。

本种和厚瓣短蕊茶 *C. crassipetala* 很接近，但叶片狭而长，先端长尾状，萼片有柔毛，花瓣较长，被短柔毛。

125. 细花短蕊茶

Camellia parviflora Merr. et Chun ex Sealy Rev. Gen. *Camellia* 139. 1958; Chang l. c. 98. 1981; Chang et Bartholomew l. c. 123. 1984.

灌木，高3米，嫩枝纤细，初时有柔毛，不久变秃。叶革质，狭椭圆形至披针形，长5—7厘米，宽1.5—3厘米，偶有长达15厘米，宽5厘米，先端钝至渐尖，基部楔形或略钝，上面干后绿色，略有光泽，下面初时脉上有毛，以后无毛，侧脉6—9对，在上下两面均隐约可见，边缘上半部有细锯齿，叶柄长3—5毫米，无毛，或有残留短毛。花细小，生枝顶叶腋，花柄长2—3毫米，有微毛；苞片2—3片，半圆形，长1—1.5毫米，无毛，贴近萼片，宿存；萼片5片，半圆形至圆形，长1.5—3.5毫米，有睫毛，宿存；花瓣白色，6片，倒卵形，长8—10毫米，基部与花丝连生，雄蕊长4毫米，无毛，花丝与花瓣连生约1.5—3毫米；子房有毛，花柱3条，长2—3毫米。蒴果扁球形，有3沟，直径1厘米，高7—8毫米，3室，每室有种子1米，中轴细，果片薄。花期4—5月。