

Bartholomew Camellias, 128, 1984.

子房 5 室，花柱 5 条，离生。

本系模式种：黄花茶 *C. flava* Chang, 产越南

2 种，产我国广西及越南太原省。

126. 五室金花茶

Camellia aurea Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni, **18** (3): 71. 1979; Tax. Gen. Camellia, 102. 1981; Chang et Bartholomew, Camellias, 129, 1984; Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni, **35** (1): 80, 1996; Chang, l. c. **35** (1): 80, 1996. — *C. quinqueloculosa* Mo et Zhong in Guihaia **5** (4): 353. 1985.

灌木至小乔木，嫩枝无毛。叶厚革质，长圆形，长 10—16 厘米，宽 3.5—5.5 厘米，先端急尖或渐尖，基部楔形或近圆形，上面干后发亮，下面无毛，侧脉 8—9 对，干后在上面陷下，网脉在上下两面均明显，边缘有锯齿，叶柄长约 1 厘米，无毛。花单生于叶腋，金黄色，花柄长 3—5 毫米；苞片 5，长约 1 毫米，萼片 5，近圆形，长 4—6 毫米，无毛，宿存；花瓣 9—12 片，椭圆形或倒卵状长圆形，长 1.5—2.7 厘米；雄蕊长 1—1.5 厘米，外轮花丝离生或略连生，无毛；子房 5 室，无毛，花柱 5 条离生，长 1.8—2.3 厘米，无毛。花期 1 月。

产广西扶绥县，生石灰岩山地常绿林。模式标本采自越南谅山省。

本种叶基部不呈心形，子房无毛，可与黄花茶 *C. flava* 区别。

系 2. 金花茶系 Ser. Chrysanthae Chang Tax. Gen. Camellia, 102. 1981.

子房 3 室，花柱 3 条，离生或下半部合生。

本系模式种：金花茶 *C. nitidissima* Chi

16 种，我国有 15 种，主要分布于广西南部。

127. 显脉金花茶 图版 28: 1

Camellia euphlebia Merr. ex Sealy in Kew Bull. 219. 1949; Sealy Rev. Gen. Camellia 41. 1958; Chang Tax. Gen. Camellia 105. 1981; Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni, **30** (2): 81, 1991; Chang l. c. **35** (1): 80, 1996.

灌木或小乔木，嫩枝无毛。叶革质，椭圆形，长 12—20 厘米，先端急短尖，基部钝或近于圆，上面干后稍发亮，下面无腺点，侧脉 10—12 对，在上面稍下陷，在下面显著突起，边缘密生细锯齿，叶柄长 1 厘米。花单生于叶腋，花柄长 4—5 毫米；苞片 8 片，半圆形至圆形，长 2—5 毫米；萼片 5 片，近圆形，长 5—6 毫米；花瓣 8—9 片，金黄色，倒卵形，长 3—4 厘米，基部连生 5—8 毫米；雄蕊长 3—3.5 厘米，外轮花丝基部连生约 1 厘米，花药长 2 毫米；子房无毛，3 室；花柱 3 条，离生，长 2—2.5 厘米。花期 2 月。

产广西防城、东兴，生于非石灰岩的石山常绿林下。模式标本采自越南太原省 Kau