

模式标本采自广西宁明，也分布于南宁。

本种与柠檬金花茶 *C. limonia* C. F. Liang et S. L. Mo 较接近，但叶片较长，无腺点，苞片萼片及花瓣均秃净，仅有睫毛，易于区别。

136. 柠檬金花茶

Camellia limonia C. F. Liang et Mo in *Guihaia* 2 (2): 63, 1982; *Chang l. c.* 35 (1): 82, 1996.

常绿灌木，高1—2米，小枝纤细，红褐色至灰褐色，无毛。叶薄革质，椭圆形或长圆形，偶为倒卵形，长4—8厘米，宽1.2—4厘米，先端尾状渐尖，基部阔楔形，上面深绿色，下面无毛，有黑腺点，侧脉5—8对，在上面下陷，网脉不明显，边缘有细锯齿，叶柄长5—8毫米。花单生于叶腋，柠檬黄色，直径1—2厘米，花柄长3毫米；苞片4—5片，细小半圆形，外面被短柔毛，边缘有睫毛；萼片5，近圆形，长2—3毫米，外面被短柔毛，边缘有睫毛；花瓣8片，外轮较小，近圆形，直径5—6毫米，表面有短柔毛，边缘有睫毛，内轮花瓣椭圆形至卵圆形，长6—12毫米，近平展，无毛；雄蕊长4—10毫米，花丝基部稍连合，有短管；子房3室，无毛；花柱3条，离生，长10—14毫米。蒴果扁三球形或扁二球形，宽1.5—2厘米，高1—1.5厘米，果皮厚1—2毫米，种子无毛。花期10月下旬至11月。

模式标本采自广西龙州县弄岗保护区，生于石灰岩山地，海拔350米的常绿林下。

本种与东兴金花茶 *C. tunghinensis* Chang 的区别，在于后者花柄较长，花较大；与平果金花茶 *C. pingaoensis* Fang 的区别在于后者花较大，叶片卵形。

137. 淡黄金花茶

Camellia flavida Chang *Tax. Gen. Camellia* 103. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias* 129. 1984; Chang in *Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni*, 30 (2): 83. 1991; 35 (1): 82, 1996. — *C. longgangensis* Liang et Mo in *Guihaia* 5 (4): 354. 1985. — *C. limonia* var. *obovata* Mo et Zhong l. c. 355. 1985.

灌木，高3米，嫩枝无毛。叶革质，长圆形或椭圆形，长8—10厘米，宽3—4.5厘米，先端渐尖，基部阔楔形，上面干后灰褐色，无光泽，无毛，下面浅褐色，无毛；侧脉6—7对，在上面略陷下，在下面突起，网脉在下面明显，边缘有细锯齿，叶柄6—8毫米，无毛。花顶生，花柄长1—2毫米；苞片4—5片，半圆形，长1.5—2.5毫米，无毛；萼片5片，近圆形，长6—8毫米，无毛，或背面上部多少有毛，离生；花瓣8片，倒卵圆形，淡黄色，长约1.5厘米，无毛；雄蕊离生，无毛；子房无毛；花柱3条，完全分离，无毛。蒴果球形，直径1.7厘米，1室，有种子1粒；果壳2片裂开，厚1—1.5毫米，种子圆球形，宽1.3厘米；有宿存萼片及苞片。花期8—9月。

模式标本采自广西龙州县的石灰岩山地。

本种近似东兴金花茶 *C. tunghinensis* Chang，但叶片较狭长，花瓣稍短小，花浅黄