

模式标本采自广西宁明，也分布于南宁。

本种与柠檬金花茶 *C. limonia* C. F. Liang et S. L. Mo 较接近，但叶片较长，无腺点，苞片萼片及花瓣均秃净，仅有睫毛，易于区别。

136. 柠檬金花茶

Camellia limonia C. F. Liang et Mo in *Guihaia* 2 (2): 63, 1982; Chang l. c. 35 (1): 82, 1996.

常绿灌木，高1—2米，小枝纤细，红褐色至灰褐色，无毛。叶薄革质，椭圆形或长圆形，偶为倒卵形，长4—8厘米，宽1.2—4厘米，先端尾状渐尖，基部阔楔形，上面深绿色，下面无毛，有黑腺点，侧脉5—8对，在上面下陷，网脉不明显，边缘有细锯齿，叶柄长5—8毫米。花单生于叶腋，柠檬黄色，直径1—2厘米，花柄长3毫米；苞片4—5片，细小半圆形，外面被短柔毛，边缘有睫毛；萼片5，近圆形，长2—3毫米，外面被短柔毛，边缘有睫毛；花瓣8片，外轮较小，近圆形，直径5—6毫米，表面有短柔毛，边缘有睫毛，内轮花瓣椭圆形至卵圆形，长6—12毫米，近平展，无毛；雄蕊长4—10毫米，花丝基部稍连合，有短管；子房3室，无毛；花柱3条，离生，长10—14毫米。蒴果扁三球形或扁二球形，宽1.5—2厘米，高1—1.5厘米，果皮厚1—2毫米，种子无毛。花期10月下旬至11月。

模式标本采自广西龙州县弄岗保护区，生于石灰岩山地，海拔350米的常绿林下。

本种与东兴金花茶 *C. tunghinensis* Chang 的区别，在于后者花柄较长，花较大；与平果金花茶 *C. pingaoensis* Fang 的区别在于后者花较大，叶片卵形。

137. 淡黄金花茶

Camellia flavida Chang Tax. Gen. *Camellia* 103. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias* 129. 1984; Chang in *Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni*, 30 (2): 83. 1991; 35 (1): 82, 1996. — *C. longgangensis* Liang et Mo in *Guihaia* 5 (4): 354. 1985. — *C. limonia* var. *obovata* Mo et Zhong l. c. 355. 1985.

灌木，高3米，嫩枝无毛。叶革质，长圆形或椭圆形，长8—10厘米，宽3—4.5厘米，先端渐尖，基部阔楔形，上面干后灰褐色，无光泽，无毛，下面浅褐色，无毛；侧脉6—7对，在上面略陷下，在下面突起，网脉在下面明显，边缘有细锯齿，叶柄6—8毫米，无毛。花顶生，花柄长1—2毫米；苞片4—5片，半圆形，长1.5—2.5毫米，无毛；萼片5片，近圆形，长6—8毫米，无毛，或背面上部多少有毛，离生；花瓣8片，倒卵圆形，淡黄色，长约1.5厘米，无毛；雄蕊离生，无毛；子房无毛；花柱3条，完全分离，无毛。蒴果球形，直径1.7厘米，1室，有种子1粒；果壳2片裂开，厚1—1.5毫米，种子圆球形，宽1.3厘米；有宿存萼片及苞片。花期8—9月。

模式标本采自广西龙州县的石灰岩山地。

本种近似东兴金花茶 *C. tunghinensis* Chang，但叶片较狭长，花瓣稍短小，花浅黄

色，花柄较短。李瑞高、何顺清在《广西植物》9 (3): 200. 1989. 发表1个新型 form. *polypetala* Li et He 是园艺上有前途的变型。

138. 平果金花茶 图版 29: 3—4

Camellia pinggaoensis Fang in Act. Bot. Yunnan. 2 (3): 339, 1980; Chang l. c. 30 (2): 83, 1991; 35 (1): 82. 1996.

138a. 平果金花茶 (原变种)

var. *pinggaoensis* S. Y. Liang

灌木，高3—4米，嫩枝无毛，干后灰褐色。叶革质，卵形或长卵形，长4—8厘米，宽2.5—3.2厘米，先端渐尖，基部阔楔形，有时近于圆形，常下延；上面深绿色，下面有黑腺点，侧脉5—6对，在下面稍突起，边缘有小齿突；叶柄长3—7毫米。花单生于叶腋，黄色，直径1.5—2厘米，花柄长4—5毫米，苞片4—5片，长0.7毫米，无毛，萼片5—6片，近圆形，长2—4毫米，有睫毛；花瓣5—6片，长8—10毫米，基部稍连生；雄蕊多数，长5—7毫米，近离生，无毛；子房无毛，花柱3条，离生，长4—6毫米，蒴果小，球形，直径1—1.3厘米，1室或2室，种子细小。花期10—11月。

模式标本采自广西平果县，海拔250米的石灰岩森林。

138b. 顶生金花茶 (变种)

var. *terminalis* (Liang, J. Y. et Su) Liang, S. Y. Jinhua Cha, 24—25, fig. 19. 1993. — *C. terminalis* J. Y. Liang et Su, in Guihaia 5 (3): 183. fig. 1985.

和原变种的区别在于花顶生，花柱合生，先端3裂。

模式标本采自广西天等县石灰岩山地常绿林下，海拔350米；也分布于扶绥。

139. 龙州金花茶

Camellia lungzhouensis Luo in Guihaia, 3 (3): 192—194, 1983; Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni, 30 (2): 84. 1991.

常绿灌木，高2—4米，树皮灰褐色。顶芽长1.5—2.5厘米，有芽鳞6—10片，被银色柔毛。叶革质，长椭圆形，长7.5—19厘米，宽3.5—6厘米，先端急尖，基部楔形或阔楔形，上面深绿色，下面无毛，有散生黑腺点，侧脉9—13对，在上面下陷，边缘有细锯齿，齿尖有黑腺点；叶柄长1—1.2厘米，无毛。花单生于叶腋或顶生，直径2—4厘米，近无柄；苞片5—6片，圆形，宽2—4毫米，外面被柔毛；萼片5片，圆形或卵形，宽3—5毫米，外面有紫色斑块，被柔毛；花瓣金黄色，9片，离生，圆形至长圆形，长1—1.9厘米，略被短柔毛；外轮雄蕊略连生，花丝管长2毫米，子房被白毛，3室，花柱3条离生。蒴果三球形，宽2—2.5厘米，被毛，果皮薄。

模式标本采自广西龙州的石灰岩山地。

本种近似薄叶金花茶 *C. chrysanthoides* Chang，但顶芽有柔毛，叶有黑腺点，子房有毛，易于区别。