

色，花柄较短。李瑞高、何顺清在《广西植物》9 (3): 200. 1989. 发表1个新型 form. *polypetala* Li et He 是园艺上有前途的变型。

138. 平果金花茶 图版 29: 3—4

*Camellia pinggaoensis* Fang in Act. Bot. Yunnan. 2 (3): 339, 1980; Chang l. c. 30 (2): 83, 1991; 35 (1): 82. 1996.

138a. 平果金花茶 (原变种)

var. *pinggaoensis* S. Y. Liang

灌木，高3—4米，嫩枝无毛，干后灰褐色。叶革质，卵形或长卵形，长4—8厘米，宽2.5—3.2厘米，先端渐尖，基部阔楔形，有时近于圆形，常下延；上面深绿色，下面有黑腺点，侧脉5—6对，在下面稍突起，边缘有小齿突；叶柄长3—7毫米。花单生于叶腋，黄色，直径1.5—2厘米，花柄长4—5毫米，苞片4—5片，长0.7毫米，无毛，萼片5—6片，近圆形，长2—4毫米，有睫毛；花瓣5—6片，长8—10毫米，基部稍连生；雄蕊多数，长5—7毫米，近离生，无毛；子房无毛，花柱3条，离生，长4—6毫米，蒴果小，球形，直径1—1.3厘米，1室或2室，种子细小。花期10—11月。

模式标本采自广西平果县，海拔250米的石灰岩森林。

138b. 顶生金花茶 (变种)

var. *terminalis* (Liang, J. Y. et Su) Liang, S. Y. Jinhua Cha, 24—25, fig. 19. 1993. — *C. terminalis* J. Y. Liang et Su, in Guihaia 5 (3): 183. fig. 1985.

和原变种的区别在于花顶生，花柱合生，先端3裂。

模式标本采自广西天等县石灰岩山地常绿林下，海拔350米；也分布于扶绥。

139. 龙州金花茶

*Camellia lungzhouensis* Luo in Guihaia, 3 (3): 192—194, 1983; Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni, 30 (2): 84. 1991.

常绿灌木，高2—4米，树皮灰褐色。顶芽长1.5—2.5厘米，有芽鳞6—10片，被银色柔毛。叶革质，长椭圆形，长7.5—19厘米，宽3.5—6厘米，先端急尖，基部楔形或阔楔形，上面深绿色，下面无毛，有散生黑腺点，侧脉9—13对，在上面下陷，边缘有细锯齿，齿尖有黑腺点；叶柄长1—1.2厘米，无毛。花单生于叶腋或顶生，直径2—4厘米，近无柄；苞片5—6片，圆形，宽2—4毫米，外面被柔毛；萼片5片，圆形或卵形，宽3—5毫米，外面有紫色斑块，被柔毛；花瓣金黄色，9片，离生，圆形至长圆形，长1—1.9厘米，略被短柔毛；外轮雄蕊略连生，花丝管长2毫米，子房被白毛，3室，花柱3条离生。蒴果三球形，宽2—2.5厘米，被毛，果皮薄。

模式标本采自广西龙州的石灰岩山地。

本种近似薄叶金花茶 *C. chrysanthoides* Chang，但顶芽有柔毛，叶有黑腺点，子房有毛，易于区别。