

本组模式种；长柄山茶 *C. longipedicellata* Chang et Fang

本组有 3 种，我国有 2 种，越南有 2 种（其中 1 种同时见于中国）。这个组与秃茶组 *Glaberrima* 容易混淆，但本组的苞多于 5 片，宿存在花柄上，而秃茶组的苞片仅有 1—2 片，在开花之前即已脱落，只遗下苞痕。

分种检索表

1. 苞片 6，萼片 7，花瓣 9，长 3 厘米，雄蕊连成短管，子房无毛，花柱 3 条，离生，叶椭圆形，长 4.5 厘米 142. 长柄山茶 *C. longipetiolata* (Hu) Chang et Fang
1. 苞片 6，萼片 5，花瓣 8—9，长 1.6 厘米，花丝管长 8 毫米，子房无毛，花柱 3 条，叶椭圆形，长 10 厘米，嫩枝无毛 143. 中越山茶 *C. indochinensis* Merr.

142. 长柄山茶 图版 30: 1—3

Camellia longipetiolata (Hu) Chang et Fang in Acta Phytotax. Sin. 18: 229. 1980. — *Theopsis longipedicellata* Hu in Acta Phytotax. Sin. 10: 141. 1958.

灌木，高 1.5 米，嫩枝纤细，被茸毛。叶革质，椭圆形或阔卵形，长 4—4.5 厘米，宽 2—3.2 厘米，先端钝尖或略钝，基部楔形，有时近圆形，上面深绿色，无毛，下面浅绿色，无毛，侧脉 5—7 对，在上面明显，在下面突起，边缘有细锯齿，叶柄长 2 毫米，上面有毛。花白色，顶生，直径 4.5 厘米，花柄长 1.2 厘米，有毛；苞片 6 片，阔卵形，长 1.5 毫米，无毛，散生于花柄上；萼片 7 片，基部连生约 2 毫米，卵形，长 4—7 毫米，宽 7—9 毫米，外面无毛；花瓣 9 片，倒卵形，基部略连生，外侧 2 片稍革质，长 11 毫米，其余长 3 厘米，宽 2 厘米；雄蕊 4 轮，长 11 毫米，花丝全部有毛，内轮雄蕊离生，外轮的 2/3 连生，子房无毛，花柱 3 条，离生，长 3.5 厘米。花期 2 月。

模式产广西，忻城，Beh Gen 村。

143. 中越山茶 图版 30: 4—8

Camellia indochinensis Merr. in Journ. Arn. Arb. 20: 347. 1939. — *Thea indochinensis* (Merr.) Gagnep. in Suppl. Fl. Gen. Indo-Chine 1: 303, 307. 1943.

灌木或小乔木，嫩枝无毛。叶薄革质或近膜质，椭圆形，长 10 厘米，宽 3—4.2 厘米，先端短尖，尖头钝，基部钝，有时近圆形，上面干后绿色，稍发亮，下面无毛，侧脉约 6 对，在上面不明显，在下面略突起，边缘有钝锯齿，叶柄长 7—10 毫米，完全无毛。花单生于枝顶，白色，直径 3 厘米，花柄长 6 毫米，无毛；苞片 6 片，成对分散于花柄的上、中、下部，半月形，长 1—2 毫米，无毛；萼片 5 片，圆形，长 4—5 毫米，无毛；花瓣 8—9 片，外侧 4 片圆形或阔倒卵形，长约 1 厘米，外面无毛，内侧有绢毛，其余 4—5 片，倒卵形，长 1.5—1.7 厘米，无毛，基部 3—4 毫米连生；雄蕊与花瓣等长，基部 6 毫米连合成短管，游离花丝无毛，子房无毛；花柱 3 条，长 1.3 厘米，无毛。蒴



图版 30 1—3. 长柄山茶 *Camellia longipetiolata* (Hu) Chang et Fang: 1. 花枝, 2. 雌蕊, 3. 雄蕊。4—8. 中越山茶 *Camellia indochinensis* Merr.: 4. 花枝, 5. 花瓣及雄蕊, 6. 雄蕊, 7. 雌蕊, 8. 子房横切。(蔡淑琴、谢庆建绘)