

本系模式种：广西茶 *C. kwangsiensis* Chang

本系有 6 种，分布于我国西南各省。

144. 疏齿茶

Camellia remotiserrata Chang et Wang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **29** (2): 88. 1990; Chang l. c. **35** (3): 14. 1996.

小乔木，嫩枝被茸毛。叶革质，长圆形至椭圆形，长 12—16 厘米，宽 4—6 厘米；先端渐尖或长尾状，基部楔形；上面干后深绿色，下面浅绿色，无毛；侧脉 10—12 对，在上面明显，在下面突起；边缘有疏锯齿，齿间相隔 5—7 毫米，叶柄长约 1 厘米。花白色，直径 4.5—6 厘米，生枝顶叶腋，花柄长 8—15 毫米；苞片 2—3 片，早落，萼片 5 片，近圆形，长 6—7 毫米，外侧无毛，内侧有贴生绢毛，花瓣 8—11 片，倒卵圆形，长 2.6—3.3 厘米；雄蕊长 2—2.5 厘米；子房 4—5 室，无毛，花柱长约 1.5 厘米，先端 4—5 裂，有时 3 裂。花期 10 月。

模式标本采自云南威信，海拔 1 100 米的疏林中。

本种近似大厂茶 *C. tachangensis* Zhang，但叶片具疏齿，侧脉较多，花柄较长，花瓣较少，子房 5 室。

145. 广西茶 图版 31: 1

Camellia kwangsiensis Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **20** (1): 89. 1981; Tax. Gen. *Camellia* 111. 1981.

灌木或小乔木，嫩枝无毛。叶革质，长圆形，长 10—17 厘米，宽 4—7 厘米，先端渐尖或急短尖，尖头钝，基部阔楔形，上面干后灰褐色，不发亮，或略有光泽，无毛，下面浅灰褐色，无毛；侧脉 8—13 对，在上下两面均稍突起，以 50°—60° 交角斜行，近边缘 3.5 毫米处相结合，网脉不明显，边缘有密锯齿，齿刻相隔 2—2.5 毫米，叶柄长 8—12 毫米，无毛。花顶生，花柄长 7—8 毫米，粗大，苞片 2 片，早落；萼片 5 片，近圆形，长 6—7 毫米，宽 8—12 毫米，背面无毛，内侧有短绢毛；花瓣及雄蕊已脱落；子房无毛，5 室。蒴果圆球形，直径 2.8 厘米（未成熟），果皮厚 7—8 毫米。宿存花萼直径 2.5 厘米。

产广西田林、云南西畴。模式标本采自广西冷水坪，生于疏林中。

本种的嫩枝及叶均秃净，叶长圆形，长 10—17 厘米，子房 5 室，果实大，果皮厚 7—8 毫米，具宿萼，直径 2.5 厘米。

146. 大苞茶

Camellia grandibracteata Chang et Yu in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **23** (1): 3. 1984.

乔木，高 12 米，胸径 60 厘米，嫩枝有微毛，顶芽被毛。叶薄革质，椭圆形，长 10—14 厘米，宽 4—5.5 厘米；先端急锐尖，基部楔形，上面深绿色，发亮，下面初时在中脉上有微毛，后变秃净；侧脉 8—10 对，在上下两面均不明显；边缘有锯齿，齿间相隔 2—