

4 毫米, 叶柄长 4—6 毫米, 有微毛。花白色, 直径 4—5 厘米, 生枝顶叶腋, 花柄长 6—7 毫米, 有微毛; 苞片 2, 卵圆形, 长 4 毫米, 革质, 多少宿存; 萼片 5—6 片, 卵形, 长 5—6 毫米, 外侧无毛; 花瓣 7—9 片, 倒卵圆形, 长 2—2.5 厘米; 雄蕊长 1.5 厘米, 无毛; 子房 5 室, 无毛; 花柱长 1.5 厘米, 先端 5 裂。蒴果近球形, 直径 3—4 厘米, 4—5 片裂开, 果片厚 4—5 毫米, 种子每室 1 个。

模式标本采自云南的云县, 海拔 1 050 米的山地疏林里。

本种与广西茶 *C. kwangsiensis* Chang 的区别在于花柄及叶柄有微毛, 果皮较薄, 和大厂茶 *C. tachangensis* Zhang 的区别。除叶柄及花柄具毛外, 花瓣较少, 果皮较厚。

147. 广南茶

Camellia kwangnanica Chang et Chen in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **23** (1): 4. 1984; Chang l. c. **35** (3): 12. 1996.

小乔木, 高 5—6 米, 胸径 31 厘米, 嫩枝无毛, 顶芽被柔毛。叶革质, 长圆形, 长 10—14 厘米, 宽 3.5—5 厘米, 先端渐尖, 基部楔形; 上面干后深绿色, 发亮, 下面橄榄绿色, 无毛; 中脉在上面突起, 侧脉每边 8—10 条, 在上下两面均明显, 边缘有细锯齿, 叶柄长 1—1.5 厘米。花白色, 生枝顶叶腋, 直径 5 厘米, 花柄长 6—7 毫米, 被柔毛; 苞片 2, 早落; 萼片 6—8 片, 卵圆形, 长 5—7 毫米, 外侧有灰白色柔毛; 花瓣 11—14 片, 倒卵圆形, 长 1.8—2.5 厘米; 雄蕊长 1.8 厘米; 子房 5 室, 无毛; 花柱长 1.5 厘米, 先端 5 裂。蒴果扁球形, 直径 3—4 厘米, 果皮厚 5 毫米。

模式标本采自云南广南县黑支果, 牧宜花果大箐, 海拔 1 800 米的常绿林中。

茶叶供饮用。

本种近似大苞茶 *C. grandibracteata* Chang et Yu, 但叶柄较长, 萼片较多, 6—8 片, 外侧被毛, 苞片较小。

148. 大厂茶

Camellia tachangensis Zhang in Acta Bot. Yunnan. **2**: 341. 1980. — *C. quinquelocularis* Chang et Liang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **20** (1): 90. 1981; Chang Tax. Gen. *Camellia* 111. 1981. Chang et Bartholomew. *Camellias*, 141, 1984. — *C. tetracocca* Chang l. c. 112. 1981.

乔木, 高 4 米, 嫩枝无毛。叶革质, 长圆形, 长 9—12 厘米, 宽 4—6 厘米, 先端急短尖, 基部楔形, 无毛, 侧脉 7—9 对, 边缘有锯齿, 叶柄长 6—10 毫米。花单生于枝顶, 白色, 直径 3—3.5 厘米, 花柄长 7—10 毫米, 无毛; 苞片 2, 生于花柄中部, 早落; 萼片 5, 肾状圆形, 长 5 毫米, 宽 7—9 毫米, 无毛; 花瓣 11—14 片, 倒卵圆形, 长 2 厘米, 基部连生, 无毛; 雄蕊长 1.2—1.4 毫米, 外轮花丝下半部连生成花丝管; 子房 3—5 室, 无毛, 每室有胚珠 1—4 个; 花柱长 1.3 厘米, 先端 3—5 裂。蒴果圆球形, 宽 2.5—4 厘米, 3—5 片裂开, 果片厚 2—3 毫米; 种子球形, 直径 1 厘米。