

Camellia rotundata Chang et Yu in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **23**(1): 6. 1984; Chang l. c. **35** (3): 13. 1996.

乔木，高8米，胸径40厘米，嫩枝被柔毛，干后褐色，顶芽被柔毛。叶薄革质，椭圆形，长8—10厘米，宽4—5厘米，先端略尖，尖头钝，基部圆形，上面干后深绿色，稍发亮，下面褐色，被柔毛；侧脉每脉8—10条，在上下两面均能见，全缘或靠近先端有细锯齿，叶柄长约5毫米，被柔毛。花白色，近顶生，直径5厘米，花柄长约1厘米，被柔毛；苞片早落；萼片5，卵圆形，长4—5毫米，被柔毛；花瓣8—10片，倒卵圆形，长2—2.5厘米，有微毛；雄蕊长1.3—1.5厘米；子房4—5室，被茸毛；花柱长1.3厘米，有柔毛，先端4—5裂。蒴果扁球形，直径5—6厘米，4—5月裂开，果片厚4—5毫米。

模式标本采自云南红河浪提，原产下寨，海拔1800米的疏林里。

152. 皱叶茶

Camellia crispula Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **20**(1): 93. 1981; Tax. Gen. *Camellia* 115. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias* 143. 1984; Chang l. c. **35** (3): 13. 1996.

小乔木，嫩枝无毛，叶薄革质，干后皱缩，披针形或长圆形，长8—10厘米，宽2—3厘米；先端渐尖，基部楔形，下延；上面干后暗晦，下面无毛，侧脉7—9对，在上下两面均明显；边缘有疏锯齿，齿刻相隔2—3毫米，叶柄长5—7毫米。花腋生，白色，花柄长1厘米，无毛。苞片2，早落；萼片5，肾圆形，长5—6毫米，宽7—8毫米，有柔毛；花瓣6—7片，基部连生；雄蕊长1.5厘米，近离生；子房有毛，5室；花柱长1厘米，有白毛，5深裂。蒴果扁球形，直径2.5厘米，5室，有5条浅沟；果片厚4—5毫米；种子每室1个。

模式标本采自云南文山县老君山一带。

153. 老黑茶

Camellia atrothea Chang et Wang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **23** (1): 5. 1984; Chang l. c. **35** (3): 13. 1996.

乔木，高13米，胸径56厘米，嫩枝无毛，干后灰白色，顶芽被柔毛。叶薄革质，长圆形，长13—18厘米，宽4—6厘米，先端尾状渐尖，尾长1.5—2.5厘米，基部楔形，上面干后灰绿色，暗晦，下面绿色，无毛；侧脉每边10—12条，在上下两面均明显，边缘有锯齿，叶柄长3—5毫米，无毛。花近顶腋生，白色，直径6厘米，花柄长7毫米，有微毛；苞片2，早落；萼片5，卵圆形，长5—6毫米，被灰色柔毛；花瓣11—14片，倒卵圆形，长2.5—3厘米，被微毛；雄蕊长1.4—1.6厘米，花丝离生；子房5室，被茸毛；花柱与雄蕊齐平，有柔毛，先端5裂。蒴果扁球形，直径4厘米，4—5月裂开，果片厚2—3毫米。花期10—11月。